




د شنو خونو په بادرنگو کې د رېښې غوټه کوونکو نيماتودونو (*Meloidogyne* spp.) وقوع، مدیریت او د حاصل د ضایعاتو مخنیوی

څېړونکي: حکمت الله نیمګړی او همکاران

پېژندنه

رېښې غوټه کوونکي نيماتودونه د نباتاتو لپاره بشپړ تخريبيونکي پتوجنونه دي. په شنو خونو کې تولېدونکي بادرنگ د رېښې غوټه کوونکو نيماتودونو لپاره د خوښې وړ کوربه بلل کېږي او د نفوس لوړه کچه يې د نباتاتو بشپړه مړینه رامنځ ته کولای شي. د پانيزو برخو ژېړوالی، مړاوې کېدنه، د بوټو مړینه او د رېښو غوټې د اخته کوربه نباتاتو څرګند علايم دي. اوس مهال شنې خونې په کندهار ولايت کې د سبزیجاتو په ځانګړي ډول د بادرنگو ځانګړې توليدي ساحې دي او په لوړه کچه توليد بازار ته عرضه کوي. دا څېړنه د کندهار ولايت په شنو خونو کې د رېښې غوټه کوونکو نيماتودونو د وقوع، د ناروغۍ د شدت، د حاصلاتو د زیان د کچې د تخمین او د چاپېريالي اړخه د دوی د خوندي مخنيوي په موخه تر سره شوې ده.



شکل (۱): الف: د رېښې غوټه کوونکو نيماتودونو په واسطه د بادرنگو اخته رېښې. الف-ح په طبيعي شکل د رېښې غوټه کوونکو نيماتودونو اخته کېدنه او شدت، د د مخنيوي په څېړنه کې د ناروغۍ شدت، د *Meloidogyne incognita* په واسطه د حاصلاتو د زیان د کچې معلومولو په څېړنه کې اخته کېدنه او د علايمو ډول.


د سروې شوو شنو خونو شمېر: ۸

د اخته شنو خونو شمېر: ۴


د اخته کېدنې لوړه کچه: ۸۰٪

د ناروغۍ د شدت لوړه کچه: ۴۸٪


د نفوس لوړه تخميني کچه: ۳۶۰ لاروې/۲۰۰ سي سي خاوره




چارټ (۱): د ناروغۍ وقوع




چارټ (۴): د بادرنگو حاصلات



چارټ (۲): د ناروغۍ شدت



چارټ (۵): د حاصلاتو زیان



چارټ (۳): د *M. incognita* نفوس

T1 = د چرګانو سره

T2 = کنجاړه

T3 = د فارم سره

T4 = کاربوفوران

T5 = کنټرول

مواد او کړنلاره

د څېړنو د تر سره کېدو موقعیتونه:

سروې: کندهار ښار مرکزي سیمه

د نيماتودونو مخنیوی: کندهار ښار شپږمه ناحیه، د زوړ ښار سیمه. (31.607° N, 65.663° E)

د حاصلاتو زیان: کندهار ښار شپږمه ناحیه، د سپین زیارت سیمه. (31.59° N, 65.66° E)

د څېړنې مواد او اندازه:

د فارم سره: ۱۰۰۰ ګرامه /نبات، د چرګانو سره: ۵۰۰ ګرامه /نبات، کنجاړه: ۳۰ ګرامه /نبات،

کاربوفوران: ۱۵۰۰ ګرامه فعاله ماده/هکتار

د څېړنې ډیزاین: RBD څلور تکرارونه

د نيماتود د نوعې پېژندنه: د بنځینه نيماتود د قاعدوي سطحې (Perineal pattern) د مورفولوژي پر

اساس تر سره شوې ده.

پایله او سپارښتنې

له کندهار ولايت څخه لومړنۍ راپور دی. د سروې شوې ساحې ۵۰٪ سلنه اخته وه. په شنو خونو کې د نوموړو نيماتودونو د مخنيوي لپاره د کنجاړې استعمال (۳۰ ګرامه/بوټي) د کيمياوي موادو (کاربوفوران) يو ښه بديل دی. د دوی په واسطه د بادرنگو د حاصلاتو زیان ۳۵٪ ثبت شوی دی. د پراخه سروې تر سره کول د مخنيوي په پلان کې په لوړه کچه مرسته کولای شي.

د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څېړنو آمریت



په افغانستان کې له امریکايي ځواکونو څخه په میراث پاته زهري کیمیاوي توکي او د هغوی ناوړه روغتيايي اغیزې

څېړونکي: پوهنپار عبدالله حقميل

پېژندنه: په افغانستان کې د امریکا له شل کلن حضور څخه نه یوازې په میلیونونو افغانان ووژل او ژوبل شول بلکې د افغانستان ځمکه، اوبه او هوا هم په ډیر ناوړه ډول باندې ککړ او اغیزمن شول. د ټول هیواد په کچه په امریکايي نظامي اډو کې په ټټونو کثافات او نور ضایعات په بې دریغه او ظالمانه ډول سوزول کیدل، په دې کثافاتو سوزولو کې هر ډول زیان راوړونکي او زهري توکي شامل وو، په پراخه کچه یې انساني روغتیا، د کرکيلي ځمکې، اوبه او هوا ککړه کړېده. په سرخلاصو کندو کې د کثافاتو سوزولو ناوړه اغیزې نه یوازې په عامو وگړي د بحث وړ دي، بلکې پخپله بهرني عسکر هم په بیلابیلو ناروغیو او بې سارې نویو سرطانې بڼو اخته شوي دي. د لوگي او غبار څخه ډکي هواوي د دې سبب شوي چې د نظامي اډو په خوا کې میشت خلک په ځانگړي ډول ښځي او ماشومان له بیلابیلو تنفسي ناروغیو، شنډتوب، ناقص زیږون او په ماشومانو کې د بدن د توازن له نیمگړتیا سره مخ کړي دي.

موندنې



شکل: په افغانستان کې د متحده ایالاتو د عسکرو لخوا په ازاده فضاء کې د توکو سوزول.

زهري توکي	ناوړه اغیزې
ډروي توکي (PMD)	تنفسي او د زړه ناروغۍ، نفس تنگی، د ریوی په دندو ځنډ، د زړه حملې، د زړه نا منظم ضربان
هایدروکلوریک اسید	د ریوی په دندو ځنډ، د پورټي تنفسي جهاز او برانشي کې التهاب
هایدروکاربنونه	د عروق شعریه غړو او الویولرونو قوخیدل، حاد تنفسي زخمونه، د ریوی پړسوب
بنزین	سرډدي، گڼگیت، د وینې ناروغۍ، سرطان، د هډوکو په مغزي برخه کې مزاحمتونه، د وینې کمښت
درانده عناصر	د زړه نا منظم ضربان، د وینې کمښت، د مغز، پښتورگو او ښي زخم
ډایوکسینونه	څو ډوله سرطانونه، د پوستکي د جوړښت غیرنارمل بدلون، د بڼې په دندو کې تغیر
هکزا کلوروینزین	ناقص معافیتي سیستم
	د پټي او نکتري سیستم ټپونه او په وده باندې اغیزې

جدول: په ازاده فضاء کې د توکو له سوزولو څخه ازاد شوي زهري توکي او د دوي ناوړه روغتيا اغیزې.

مواد او کړنلاره: دا څېړنه د بیلابیلو نړیوالو اژانسونو او د افغانستان له پاره د امریکا د څار ادارې (سیکار) (WHO) او نورو معتبرو ژورنالونو څخه د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ تر سره شوي ده.

پایله او سپارښتنې: بهرنیو قواو د خپل شل کلن اشغال په ترڅ کې په آټکلي ډول 2,920,000 ټنه د کثافاتو او ضایعاتو بیلابیل ډولونه په افغانستان کې سوزولي دي. له دوي څخه چاپیریال، اوبو او هوا ته را ډبره شوي ستونزي ډیري پراخي او هر اړخيزي دي. د کثافاتو سوزولو څخه په هوا کې ډایوکسین، ډروي ککړونکي توکي، پولي سایکلیک اروماتیک هایډروکاربنونه، الوتونکي عضوي مرکبات، کاربن مونو اکساید، هکزا کلوروینزین او درانده فلزي عناصر چاپیریال ته ازادیدل. دې زهري توکو د افغانانو په کرکيله، اوبو، روغتیا او غذايې مصونیت باندې یې ډیري ناوړه اغیزې ښندلي دي. عمده رامنځته شوي او یا هم په راتلونکي کې رامنځته کیدونکي ناروغۍ یې تنفسي-ستونزي (ساه لنډې، Bronchitis, Sinusitis, Bronchiolitis، نوري نښاني یې ناپېژانده نس دوامداره ټوخی)، مزمني تنفسي-ناروغۍ لکه نوري نښاني یې ناپېژانده نس ناستي، شدید تبه او د ټپونو مزمن عفونت، په میندو کې د شنډتوب او په زیږون کې د نیمگړتیا کچه لوړیدل، په ماشومانو کې گڼگیت او د توازن ستونزي، د سږو، مغز، پوستکي او د وینې د سرطانونو کچه لوړیدل، بیلابیل ډولونه الرژي، عصبي ستونزې او داسې نورو څخه عبارت دي. د کثافاتو سوزولو له روغتیا زیانونو هاخوا د کرکيلي ځمکو، اوبو او هوا په ککړتیا کې پوره ونډه لرلې ده

د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څېړنو آمریت



د هوري پر حاصل د FYM او غيري عضوي سرو څېړنه



څېړونکی: پوهنيار صديق الله احساس

پېژندنه

هوره چې علمي نوم يې (*Allium sativum* L.) د *Alliaceae* کورنۍ نباتاتو پورې اړه لري اصل مرکز يې د افغانستان د شمالي برخې غربي سيمي گڼل کيږي. د جنسيت له اړخه شنه ده ولي په دوديز شکل د هوري دشنې يا پلې په شکل کرل کيږي. د هوري غټي يو د بل څخه بيلا بيل تعداد ۵-۴۵ لري. هند يې دوهم لوی توليدونکی هيواد دي هوره د خوراکي ارزښت له مخې چې د زرغوني تنې او ميوې څخه يې گټه اخيستل کيږي، په خپل ځان کې ويتامينونه، پروتينونه، قندونه، پاسفيټ، پوتاشيم، سلفر، فايبر او ايودين خورا په پراخه پيمانه لري له بله اړخه هوره په پخلي کې د پوډر، اچارو، چگني، په پاخه شکل او اومه شکل په سلاډ کې، د هند په طبي برخه کې هم زياتو درملو کې ورڅخه استفاده کيږي.

موندنې

Table 1: Impact of NPK and FYM on neck, polar, and equatorial bulb sizes

Treatment	Bulb polar diameter (cm)	Bulb size polar equatorial meter (cm)	Neck diameter (cm)
T ₀ Control	4.05 ^c	3.73 ^c	1.46 ^{bc}
T ₁ Farm yard manure (FYM) 15 t/ha	4.96 ^b	4.17 ^{bc}	1.57 ^{abc}
T ₂ FYM 15 t/ha + NPK 140: 70: 70 Kg/ha	5.62 ^{ab}	5.05 ^a	1.88 ^a
T ₃ FYM 15 t/ha + NPK 160: 80: 80 Kg/ha	6.01 ^a	4.50 ^{abc}	1.86 ^{ab}
T ₄ Farm yard manure (FYM) 10 t/ha	5.54 ^{ab}	4.43 ^{abc}	1.52 ^{abc}
T ₅ FYM 10 t/ha + NPK 140: 70: 70 Kg/ha	5.84 ^a	4.58 ^{ab}	1.82 ^{ab}
T ₆ FYM 10 t/ha + NPK 160: 80: 80 Kg/ha	5.80 ^a	4.43 ^{abc}	1.63 ^{abc}
T ₇ NPK 140: 70: 70 Kg/ha	5.44 ^{ab}	3.94 ^{bc}	1.38 ^c
T ₈ NPK 160: 80: 80 Kg/ha	5.28 ^{ab}	4.23 ^{bc}	1.48 ^{abc}
CV%	2.120	2.120	2.120
LSD%	0.834	0.806	0.413

T/hectar



■ control ■ T1 ■ T2 ■ T3 ■ T4 ■ T5 ■ T6 ■ T7 ■ T8

Table 4. Bulb fresh weight g, yield per plot kg and yield per hectare

Treatment	Bulb weight Fresh	Yield per plot kg	Yield per hectare kg
T ₀ Control	25.64 ^b	3.35 ^c	7.45 ^c
T ₁ Farm yard manure (FYM) 15 t/ha	34.08 ^a	3.54 ^c	7.86 ^c
T ₂ FYM 15 t/ha + NPK 140: 70: 70 Kg/ha	36.95 ^a	4.21 ^b	9.37 ^b
T ₃ FYM 15 t/ha + NPK 160: 80: 80 Kg/ha	40.71 ^a	4.81 ^a	10.69 ^a
T ₄ Farm yard manure (FYM) 10 t/ha	33.78 ^a	3.42 ^c	7.61 ^c
T ₅ FYM 10 t/ha + NPK 140: 70: 70 Kg/ha	38.28 ^a	4.20 ^b	9.34 ^b
T ₆ FYM 10 t/ha + NPK 160: 80: 80 Kg/ha	36.46 ^a	4.80 ^a	10.66 ^a
T ₇ NPK 140: 70: 70 Kg/ha	38.80 ^a	4.47 ^{ab}	9.93 ^{ab}
T ₈ NPK 160: 80: 80 Kg/ha	36.68 ^a	3.36 ^c	7.47 ^c

مواد او کړنلاره: ياده څېړنه په ۲۰۲۰-۲۰۲۱ ميلادي کال د ژمي په موسم د جدي مياشت کې د اناسټو پوهنتون په څيږنيز فارم کې تر سره شوی، تر څو د هوري پر حاصل باندې د نايټروجن، پوتاشيم او فاسفورس او عضوي سري FYM د مختلفو اندازو اغيزې معلومي او تر څنگ يې د عناصرو مناسب اقتصادي او دپام وړ ډوز وموندل شى. نوموړی څيږنه په (RBD) ډيزاين او دريو تکرارونو کې تر سره شوې. په دې څيږنه کې ټول (۹) تريمينټونه چې دوه يې د (NPK) په ترتيب سره ۱۶۰: ۸۰: ۸۰ Kg/ha او ۱۴۰: ۷۰: ۷۰ Kg/ha او دوه يې د (FYM) په ترتيب سره ۱۵ t/ha او ۱۰ t/ha مختلفي اندازې او د دوي گډ حالت او يو يې کنټرول وو چې په دريو وختونو کې ورکړل شويدي.

پايله او سپارښتنې: پايلو وښودل چې ۱۶۰: ۸۰: ۸۰ Kg/ha نايټروجن، فاسفورس او پوتاشيم او ۱۵ t/ha عضوي سري د استعمال د هوري نبات پر حاصل د پام وړ اغېزه درلوده. نوموړی تريمينټ د نورو تريمينټونو په پرتله د تر ټولو زيات د هوري حاصل چې (۱۰.۶۹ t/ha)) وو تر لاسه شوی دی. همدارنگه د نايټروجن، فاسفورس او پوتاشيم د مختلفو اندازو په کارولو سره د مناسب اقتصادي ډوز ۱۶۰: ۸۰: ۸۰ Kg/ha او د عضوي سري مناسب اقتصادي ډوز ۱۵ t/ha لاسته راغلی وټاکل سو. دا څيږنه د کندهار ولايت اناسټو په څيږنيز فارم ريگي لوم خاوره کې گډ استعمال د هوري د حاصلاتو پر زياتوالي باندې مثبه اغېزه درلوده.

د ترسره سوي څيږنې څخه دا په ډاکه سوه چې د عضوي او غيري عضوي سرو استعمال او مديريت د نبات په حاصل باندې د پام وړ تغير راولي نو ځکه بايد دواړه په مخلوط شکل ته ورکړل سي.

په لوگر کې د تازه شیدو د ارزښت کړۍ اقتصادي تحلیل


څېړونکي: پوهنمل نعيم جان عادل

پېژندنه: ساینس شیدې یوه مکمله، با کیفیت او بیلاس شوی غذا بولي او دا یې ثابتې کړې چې د غذایی موادو د ټولو اجزاو څخه چې د انسان بدن ورته ضرورت لري ترکیب شوی کوم چې په خپل ترکیب کې پروتین، شحم، لکتوز، مختلف ویتامینونه او منرالونه لري او په تی لرونکو حیواناتو کې د لنگون څخه وروسته دغلانځي دغذواتو په واسطه سره تولیدیږي او د انسانانو په ژوند کې د ملاحظې وړ ارزښت لري. ددې څېړنې اصلي موخې او تمرکز په لوگر کې مالدارانو ته د تازه شیدو د اغیزمنې ارزښت کړۍ معلومول، د کوپراتیفې او عامو مالدارانو ترمنځ د تازه شیدو د ارزښت کړۍ عناصر، د شیدو تولید، لگښت، عاید او مارکیت چپنل موثریت پرتله کول، د کوپراتیفې (گذرگاه غړی مالداران) او عامو مالدارانو ترمنځ د اقتصادي گټو پرتله او تحلیل په گوته کول وو. ترڅو معلوم شي چې کوم چپنل د تولیدونکي لپاره موثر دی. د یادې څېړنې ارزښت مالدارانو ته د تازه شیدو د ارزښت کړۍ معلومول، په سیمه کې مالداري ته وده ورکول او د تازه شیدو پلورل د یوې اقتصادي او اغیزمنې کړۍ له لارې د مالدارانو تشویق کول وه، په لوگر کې تازه شیدې او نور لبنی محصولات په پراخه پیمانه تولیدیږي، خو په کلیو او بانډو کې د یو منظم بازارموندنې سیستم د نشتوالي په صورت کې په ټیټ او کمه بیه پلورل کېږي، چې له یو اړخه د مالدارانو د نا هیلي کیدو سبب گرځي او له بل لوري د مالدارانو د اقتصادي زیان سبب گرځي. د څېړنې په بهیر کې یادې ټولې ستونزې په گوته، او د حل لارې چارې ورته په ملي او نړیواله کچه وړاندې شوي او ددې معلوماتو څخه به د شیدو فارم لرونکي، مالدارن، مسلکبان، استادان، زده کوونکي او ټول مینه وال گټه اخیستلي شي.

موندنې

(۱) جدول: د کوپراتیفې او عامو مالدارانو تر منځ د شیدو تولید، لگښت او عاید پرتله.

مالداران	د شیدو مجموعي تولید اوسط	د فی لیتر شیدو قیمت اوسط، په افغانۍ	د مجموعي تولید شوو شیدو قیمت اوسط، په افغانۍ	فی لیتر لگښت اوسط، په افغانۍ	مجموعي لگښت اوسط، په افغانۍ	خالصه گټه
کوپراتیفې مالداران	۴۳	۳۰	۱۲۷۴	۴	۱۶۹	۱۱۰۵
عام مالداران	۳۲	۲۳	۷۵۰	۶	۲۰۵	۵۴۵
کوپراتیفې مالداران	۴۸	۳۰	۱۴۱۸	۴	۲۰۸	۱۲۱۰
عام مالداران	۵۴	۲۴	۱۳۳۶	۱۲	۲۹۶	۱۰۳۲



(۱) گراف: د گذرگاه لبنیاتو فابریکې د ۱۳۹۸ کال د هرې میاشتې د لبنی محصولاتو د بازار موندنه



(۱) شکل: د مصرف کوونکو پواسطه د تازه شیدو او پیک شویو شیدو د مصرف (%)

مواد او کړنلاره

د څېړنې پیل او ځای: دا څېړنه په ۱۳۹۸ ل. کال د مرغومي میاشتې پر ۱۵ نیټه د لوگر ولایت مرکز پل علم او محمدآغی ولسوالۍ کې (د تازه شیدو د ارزښت کړۍ اقتصادي تحلیل) تر سر لیک لاندې پیل او د ۱۳۹۸ ل. کال د چنگاښ میاشتې پر ۱۰ نیټه پای ته ورسیده.

د څېړنې ډیزاین: دغه څېړنه د توصیفې (Descriptive) څېړنې د میتود څخه په استفادې د پوښتنپانې د میتود (Questionnaire method) پواسطه پر مخ وړل شوې ده. په دې څېړنه کې د تازه شیدو د ارزښت کړۍ ۱۳۷د غړو څخه چې عبارت دی له د شیدو تولیدونکي (کوپراتیفې مالداران، عام مالداران، تجارتي فارمونه، پروسیس فابریکه، پرچون پلورونکو، د شیدو ټولونې کوپراتیفونه او د مصرف کوونکو څخه معلومات راغونډ شوي دي. د ارقامو او اندازو راټولونې په طریقه کې له فارمدارنو سره مخامخ لیدنې، مرکې، د پوښتنپانو ویشل او داسې نورو وسیلو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د تر لاسه شوو ارقامو تحلیل او تجزیه د MS excel او احصایو میتودونو پواسطه ترسره شوی. د مقداري ارقامو اعلی، ښه او کمزوری ټکي په سلنې (%) سره په جدول، گراف اوشکل کې ښودل شوي.

پایله او سپارښتنې: د څېړنې پایله په گوته چې کوپراتیف غړی مالداران د عامو مالدارانو په نسبت زیاته گټه لاسته راوړي دا ځکه چې کوپراتیفې مالداران د کوپراتیفې روغتیايي خدماتو څخه برخمن دي او په وړیا توگه ورته لاس رسی لري او خپلې تولید شوي شیدې په ټاکلې وخت کوپراتیف ته وړاندې کوي. د څېړنې پایلې ښايي په لوگر کې د تازه شیدو د ارزښت اغیزمنه او اقتصادي کړۍ (موثر چپنل) د مالدارانو او تجارتي فارمونو لپاره کوپراتیف دی. د شیدو غواگانو د تجارتی فارمونو تجاران چې د شیدو غواگانو د فارم په جوړولو باندې زیات مصارف کوي، ولې کټه یې دومره زیاته نده، ولې د کوپراتیفې مالدارانو گټه نسبت تجارتی فارمونو ته زیاته ده، ځکه چې تجارتی فارمونه ټول روغتیايي خدمات د پیسو په بدل کې ترسره کوي او بل داچې د شیدو د خرڅلاو کانال یې ځانگړی او گټور نه وو. دگذرگاه د لبنیاتو فابریکې مربوطه کوپراتیفونو څخه د شیدو راټولول او پروسیس اسانه لگښت یې کم او گټه یې زیاته ده، ځکه چې تازه شیدې پاکي او د شحم فیصدي سلنه یې هم مناسبه وي. ۹۱ سلنه پرچون پلورونکي د عامو مالدارانو څخه او ۹ سلنه یې د تجارتی فارمونو څخه تازه شیدې پیږي، د پرچون پلورونکي د شیدو د اخیستلو معیار کیلو گرام وزن دی، او د خرڅولو معیار یې هم کیلو گرام دی.

سپارښتنې

- ❖ دولت باید د مالدارۍ په برخه کې مناسبه اندازه سرمایه گذاری وکړي او خارجي محصولات په تدریجي شکل سره بند کړي، ترڅو زمونږ هیواد وال د خپلو لوړ کیفیت لرونکو حیواني محصولاتو څخه استفاده وکړي
- ❖ د شیدو د کوپراتیفونو د اقتصادي ارزښت کړۍ په اړه مالدارانو ته معلومات ورکول.
- ❖ په کلیو او بانډو کې د شیدو د تولید د زیاتوالي په منظور مالدارانو ته د شیدو ورکونکو غواگانو په برخه کې د خدمتونو وړاندې کول.
- ❖ په سیمه او هیواد کې د شیدو ورکونکو غواگانو د اصلاح شویو نسلونو د رواج کولو له لارې د شیدو تولید زیاتول.
- ❖ د هیواد په ټولو گمرکونو کې د شیدو د کیفیت کنترول مرکزونه جوړ او مسلکي کسان پکې وگماري، ترڅو هیواد ته وارداتي شیدې معاینه شي او د تقلبي او خرابو شیدو د دخول څخه مخنیوی وشي،




د مارو کڼو د سپرغوري ناروغۍ پر کنترول د غوا د تازه شیدو، د نیم د پانو د شیرې، لمرگلي غوړو او فنگس وژونکو (پنکونازول) د اغیزو پرتله کول

څیړونکي: قدرت الله دوست


پېژندنه: د نباتاتو د حاصلاتو زیاته برخه د نباتي ناروغیو په وسیله لمنځه ځي چې د حاصلاتو د لمنځه تلو د مخنیوي لپاره په زیاته پیمانه کیمیاوي مواد کارول کیږي کوم چې د کیمیاوي موادو استعمال د محیط د ککړتیا سبب گرځي، ددې هدف ترلاسه کولو لپاره چه د سپرغوري ناروغۍ کنترول د داسي موادو په مرسته وسي چه محیط ته کوم زیان و نه لري او محیط خونوونکي وي. ځکه مي د سپرغوري ناروغۍ په کنترول کې ۵۰٪ د غوا تازه شیدې، ۲۰٪ د نیم پانو شیر، ۵٪ د لمرگلي غوړو څخه د محلي موادو په ډول استفاده وکړل ترڅو د یادي ناروغۍ د کنترول لپاره د پنکونازول فنگس وژونکو ښه بدیل و موندل سي پایله دا سول چې د سپرغوري ناروغۍ د علایمو د ښکاره کیدو وروسته د پنځه اونيو لپاره په اونۍ کې یو ځل ۵۰٪ د غواتازه شیدې کولاي سي چه د پنکونازول ښه بدیل سي. د غوا د شیدو وروسته د نیم د پانو شیر او لمرگلي غوړي د یادي ناروغۍ په کنترول کي اغیزمن رول لرل.

موندنې


په نبات او کرونده کي د ناروغیو پر شدت د استعمال سوو موادو د اغیزو موثریت.



پر یو شمیر وده نیزو برخو د پنکونازول فنگس وژونکي او محلي موادو د اغیزو پرتله.



د مارو کڼو پر یو شمیر وده نیزو برخو د پنکونازول او محلي موادو د اغیزو پرتله.



مواد او کړنلاره


دغه څیړنه د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژ ملي پوهنتون څیړنیز فارم کې د شنې خونې په شرایطو کې په ۲۰۲۱ کال تر سره سوي. څیړنه په (RCBD) (Randomized Complete Block Design) څیړنه کې په پنځه تیریمتیه او څلور تکراره کې ترسره سوي. په څیړنه کې ۵۰٪ د غوا تازه شیدې، ۲۰٪ د نیم وني د پانو شیر، ۵٪ د لمرگلي غوړي او ۱۰۰ اي سي توفاس (۱۰٪ پنکونازول) کارول سوي. د موادو کارول لومړۍ د سپرغوري د ښو د ښکاره کیدو سره پیل او د پنځه اونيو په جریان کې په اونۍ کې یو ځل د نبات پر شنو برخو باندې شندل کیدل. د ناروغۍ په کنترول کې د استعمال سویو موادو د اغیزو پرتله کولو لپاره د ناروغۍ شدت معلومول، د نبات شنې ودې او حاصلاتو له برخې څخه ډاټا د لومړۍ درمل شیندلو څخه اوه ورځي وروسته هره اونۍ یوځل ډاټا ټول کړل سول. ډاټا (ANOVA) سافټویر په مرسته تحلیل او تجزیه سول.

پایله: د څیړنې په پایله کې وموندل سول چې پنکونازول ۱۰٪، ۲۰٪ د نیم د پانو شیر، ۵۰٪ د غوا تازه شیدې او ۵٪ د لمرگلي غوړي که درې ځله د یوې هفتې په فاصله کې وشیندل سي سپرغوري ناروغي کنترولولاي سي. دا چې پنکونازول کیمیاوي مواد دي او د محیط ککړوي او د زیان سبب کیږي. ځکه نو ضرورت لیدل کیږي تر څو داسي محلي مواد وموندل سي چه د ناروغیو د کنترول لپاره داسې محلي مواد ولیدل سي چه د دغه ډول کیمیاوي موادو بدیل سي. په دغه څیړنه کي و موندل سول چه د غوا تازه شیدې د پنکونازول ښه بدیل دي.

د لږ لگښته غذايي توکو د کمښت خوار خواکي او د کنترول لاري

څېړونکی: پوهندوی سیداحمد سیدی، د بایوټکنالوژي او تخمونو د تولید څانګه، نباتي علومو پوهنځی

پېژندنه: د لږ لگښته غذايي توکو اصطلاح د بیلابیلو ویتامینونو او منرالونو له پاره استعمالیږي کوم چې لږ مقدار یې زموږ د بدن د زیاترو نارمل میتابولیکي پروسو له پاره اړینه دي. د لږ لگښته غذايي توکو د کمښت خوارخواکي په خوړل سوې غذا کېنې د یوه یا زیاتو منرالونو او یا ویتامینونو د لږوالي له امله، او یاد کافي اخیستلو په صورت کېنې چې کله د هغوی په جذب کېنې د کومې ناروغي یا انتان له امله ستونزه موجوده وي، منځته راځي. ویتامینونه او منرالونه په ځانګړې توګه د A ویتامین، فولیت (vitamin B9)، تیامین (vitamin B1)، رابوفولین (vitamin B2)، نیاسین (vitamin B3)، ویتامین B12 او ویتامین B6، ویتامین C او D، اوسینه، ایوډین، زینک او داسې نور د لږ لگښته غذايي توکو مهمې بیلګې دي چې زموږ بدن ورته اړتیا لري.



د لږ لگښته غذايي توکو تغذیوي حالت کېدای سي له کمښت څخه د زیاتوب تر کچې ورسېږي لکه چې په شکل (1) کېنې ښودل سوي دي. په شکل کېنې لیدل کېږي چې د لږ لگښته غذايي توکو د ډیر کمښت او زیاتوب په دواړو صورتونو کېنې په ترتیب سره د شدید کمښت او زهریت له امله مړینه رامنځ ته کېدای سي.

(3) جدول: د یوشمیر ویتامینونو تغذیوي ارزښت او زیرمي ښودل سوي دي.

ویتامینونه	فزیاولوژیکي دندې	د کمښت ستونزې	غذايي زیرمي
ویتامین-A	د لید میکانیزم، د جین فعالیت، وده او انکشاف، د قاعی فعالیتونه،	شب کوری، د لید کموالی، دایمي روڼدالی	حیواني محصولات، پریکورسوري په رنگه دانه بابو او سبو کېنې شتون لري.
ویتامین-D	د هډوکو تشکیل او د کلسیم جذب او کنترول	د هډوکو نرم والی	لبنیات
ویتامین-C	بیلابیلې میتابولیکي دندې، د اوسپنې د جذب زیاتوالی	د وریو وینې کیدل (Scurvy)، د انتاناتو په وړاندې حساسیت	میوې، پټاټې
پایریډوکسین Vitamin B6	د زیاتو انزایمي تعاملاتو کوډکتور	ښایي زخمونه، د پوستکي التهاب، کم خونی او نوری ستونزې منځته راوړي.	غوښه، نباتات، بشپړ دانه باب
فولیک اسید Vitamin B9	د DNA، RNA او پروټینو ترکیب	د زیږیدو پرمهال د عصبي تیوب معیوبیت	شنه-پانیز سایه، سیتروس میوې
کوبالامین Vitamin B12	د انزایمي تعاملاتو او فولیک اسید د تشکیل له پاره کوډکتور	وژونکي کم خونی، ناسم دفاعی فعالیت	یوآزی په حیواني محصولاتو کېنې

د کنترول لاري

1. د بشپړونکو توکو استعمال (Supplementation)
2. د غذايي توکو بډاینه (Food Fortification)
3. غذايي تنوع (Dietary Diversification)
4. عامه صحي ګامونه

پایله او سپارښتنې

داچې افغانستان یو بیوزله هیواد دی او زیات شمیر وګړي یې د لږلگښته غذايي توکو په خوارخواکي اخته دي، د ستونزې د کابو کولو له پاره لاندې سپارښتنې کېږي:

- دولت ته لازمه ده چې د خلکو د اقتصادي وضعیت د سمون له پاره کولتلي ګامونه واخلي.
- د وګړو اړتیا ته په کتو د روغتیا او کرنې وزارتونو مسئولینو ته لازمه بولم چې په همغږۍ د اساسي غذايي توکو (اوږو، غوړیو، بوړې، مالګې او داسې نور) د بډایني له پاره پلان جوړ او عملي کړي.
- په کورنیو کېنې باید هڅه وسي چې د یونواخته خوړو په عوض غذايي تنوع په پام کېنې ونیسي او پر غله جاتو برسیره له حیواناتو، میوو، غوښو، هګیو او لبنیاتو څخه استفاده وسي.
- په کور کېنې باید و حفظ الصحې ته ځانګړې پاملرنه وسي.

د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څېړنو آمریت

مواد او کړنلاره

دا علمي څېړنه چې «د لږ لگښته غذايي توکو د کمښت خوار خواکي او د کنترول لاري» ترسرلیک لاندې ټاکل سوي، د بشپړتیا له پاره یې له بېلابېلو معتبرو علمي زیرمو لکه علمي ژورنالونو، کتابونو، څېړنو، راپورونو او ویبپاڼو څخه ګټه اخیستل سوي ده. په یادو علمي زیرمو کېنې د موضوع اړوند معلومات تر مطالعې او تحلیل وروسته په پوره غور سره راټول سوي او د دې علمي څېړنې په لیکنه کېنې ځای ورکړل سوي دي.

موندنې

په نړیواله کچه د لږ لگښته غذايي توکو د خوارخواکي درې عمده ډولونه د اوسپنې، ویتامین-A او ایوډین له کمښت څخه عبارت دي چې لږ تر لږه د نړۍ یوه دریمه برخه اغیزمنوي.

(1) جدول: په نړۍ کېنې د WHO د ساحو پر بنسټ د درې عمده لږلگښته غذايي توکو خپراوي ښو دل سوي دي.

د WHO ساحې	کم خوني (د نفوسو کچه)		د ایوډین ناکافي اخیستل (د نفوسو کچه)		د ویتامین-A کمښت (د ښوونځي له عمر ټیټ ماشومان)	
	د میلیون له مخې	د فیصدی له مخې	د میلیون له مخې	د فیصدی له مخې	د میلیون له مخې	د مجموعي فیصدی له مخې
افریقا	244	46	260	43	53	49
امریکا	141	19	75	10	16	20
جنوب ختیځه آسیا	779	57	624	40	127	69
اروپا	84	10	436	57	ارقام نسته	ارقام نسته
د مدیترانې شرقی سیمې	184	45	229	54	16	22
غربي فاسفیک	598	38	365	24	42	27
مجموعه	2,030	37	1,989	35	254	42

(2) جدول: د یوشمیر لږلگښته غذايي منرالونو تغذیوي ارزښت او زیرمي ښودل سوي دي.

منرال	فزیاولوژیکي دندې	د کمښت ستونزې	غذايي زیرمي
اوسپنه	د هیموګلوبین تشکیل، د اکسیجن انتقال، حجروي اوکسیدیشن	کم خونی، ناسم انکشاف، د ذهنی او د فزیکي کار لږ وړتیا	غوښه، لوییا
زینک	وده، د زخم رغیدول، ذایقه، د انسولین فعالیت	د ودې او جنسی انکشاف کموالی، د ناروغیو په وړاندې حساسیت	لبنیات، غوښه، شیل فیش
ایوډین	د تایراید غدې فعالیت، د حجروي اوکسیدیشن تنظیم	جاغور	بحری خواړه، ایودایز مالګه



په کندهار ولایت کښې د پنبې نبات د درو وړایتیو د حاصلاتو او عایداتو پرتله

څېړونکی: پوهندوي قدرت الله احسان

پېژندنه: پنبه یو صنعتي نبات دی چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې کرل کېږي او په نړۍ کې توکرانو اوبدلو، د دانې څخه ئې د غوړیو په ایستلو او کنجاري څخه ئې د څارویو د غذا په توګه استفاده کېږي. پنبې نبات تخمونه د 48%-36% پوري پروتیني مواد لري چې د ژونديو موجوداتو د ژوندانه تیروولو لپاره د یاد پروتین سلنه زیاته د ارزښت وړ ده. د پنبې نبات په نړۍ واله کرڼه او تجارت کې زیات رول لري او د پنبې نباتاتو د تخمونو څخه ئې د تر لاسه سوو محصولات په سوداګري کې مهم ځای لري، په ۲۰۱۸ میلادی کال په افغانستان کښې شپږدیرش زره (36000) هکتاره مځکه د پنبې کښت او کرونده تر سره سوي ده، چې د حاصلاتو او عایداتو د لږوالي عمده لامل د پنبې د اصلاح سوو وړایتیو نه موجودیت ئې عمده ستونزه ده. د دې څېړنې مهم هدف دادی ترڅو د کندهار ولایت د پنبې د نبات د لوړ حاصل لرونکې وړایتۍ معلومه کړو او د کندهار په اقلیمي شرایطو کې ښه کیفیت او کیمیت درلودونکي وړایتی په ډاګه سي.

جدول (1): د پنبې د وړایتیو د تخمونو حاصلات، پروړو حاصلات، د تارونو حاصلات او (Harvest Index) سلنه.

حاصلات کیلو ګرام پر هکتار				Treatments مشاهدات
پروړ	تخمونه	د پنبی تارونه	Harvest Index (%)	
د پنبی وړایی				
4,329.7	2,713.3	959.1	38.5	V ₁ = Acala 15-17-99
5,062.4	3,079.1	672.9	37.7	V ₂ = FAO-108
5,583.2	4,863.3	1,808.9	46.6	V ₃ = N-726
26.59	33.45	26.01	0.35	SE(d)
75.81	95.37	74.16	1.01	C D (P=0.05)

جدول (2): د پنبې د وړایتیو د تخمونو حاصلات، پروړو حاصلات، د تارونو حاصلات او (Harvest Index) سلنه.

عایدات افغانی پر هکتار				Treatments
ټول لگښتونه	ټول عایدات	خالص عایدات	B:C	
د پنبې وړانځی				
55600	150,590	94,990	2.702	V ₁ = Acala 15-17-99
55600	170,893	115,293	3.065	V ₂ = FAO-108
55600	269,915	214,315	4.870	V ₃ = N-726
/	1856	1856.733	0.034	SE(d)
/	5293	5293.163	0.097	C D (P=0.05)




Figure 1. Influence of cotton genotypes on seed yield, stover yield and lint yield and HI in Kandahar province. The value of Gross returns in Multiplied by 10².

مواد او کړنلاره: دا څېړنه په سهیل لوېدیځي حوزې د کندهار ولایت د انستو پوهنتون په څېړنیز، ترویجی او تولیدي فارم کښې ترسره سوي ده. ذکرسوي سیمه د گرم او وچ اقلیم لرونکې ده. په څېړنه کښې په درې تکراره د پنبې درې وړایتی (Acala 15-17-99)، (FAO-108) او (N-726) د (RCBD) ډیزاین سره کرل سوي. و ټولو ترټمنتونو ته (100 kg N/ha)، (40 kg P/ha)، (60 kg K/ha) او (10 kg S/ha) کود ورکول سوي. د پلاتونو تر منځ فاصله یو متر او د پلاتونو پراخوالي (3 x 3=9m²) او په هغو کښې د پنبې د نباتاتو او قطارونو ترمنځ فاصله (40 cm x 60 cm) په پام کې نیول سوي وه. څېړنه د ۱۴۰۰ لمريز کال د جوزا د میاشتي په ۱۰ مه نېټه پیل او د همدې کال تر ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ل. نېټې پوري ئې دوام درلودی، چې ټول ۱۷۵ ورځې ئې په بر کښې نیولي دي.

پایله او سپارښتنې: په څېړنه کښې د (N-726) وړایتی څخه تر نورو دوو وړایتیو ډېر حاصلاتو او عایدات په لاس راغلي وه چې د حاصل عامیلونو (38.4 غوزې پر نبات، 3.5 ګرامه د یوې غوزې وزن، 29.8 دانې تخمونه پر غوزه او 1157 دانې تخمونه پر نبات) تولید کړي دي. همدا ډول د پروړو حاصلات (5583 kg/ha)، د تخمونو حاصلات (4863 kg/ha)، د پنبې د تارونو حاصلات (1808 kg/ha) کیلو ګرامه پر هکتار، د اوبو د استعمال وړتیا (9.7)، ټوله عایدات (269915 ډ)، خالص عایدات (214315 ډ) افغانی پر هکتار او د عاید او لګښتونو ترمنځ نسبت (4.87) په لاس راغلي او ورځني حاصلات 32.5 کیلو ګرامه او ورځني عایدات 1045 افغانی تر لاسه سوي دي. په پایله کښې و کروندګرو ته سپارښتنه کوو چې د پنبې (N-726) اصلاح سوي وړایتی په کرلو سره به لوړ حاصلات او عایدات ترلاسه کړي، تر څو د کروندګرو د ژوند په ښه کولو او اقتصادي حالت برابرولو کښې به اغېزمن رول ولوبولای سي.




د جوارو پر حاصلاتو او عایداتو د نباتاتو تر منځ فاصلې او نایتروجن د استعمال اغېزې


څېړونکي: یوهندوی قدرت الله احسان

پیژندنه: جوار (*Zea mays* L.) په نړۍ کې د غله دانو په ډله کې له غنمو او وریجو څخه وروسته د انساني او حیواني غذايي ارزښت په درلودلو سره او د کرنیزې ساحې او تولید له مخې د دریم مقام درلودونکي دي. د جوارو نبات د تخمونو د تولید پروسه یوازې په یوه نبات کې سره ته رسوي نو ځکه د نباتاتو ترمنځ فاصله د نباتاتو پر تخمونو باندې په احصائیوي ډول سره تاثیر لري، په یوه مشخصه ساحه کې د نباتاتو شمېر د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیر لري، دا خبره زیاتو څېړونکو واضحې کړې ده چې د جوارو نباتاتو تر منځ فاصله د نباتاتو پر وچ وزن، حاصلاتو او عایداتو باندې د پام وړ اغیزه کوي. له همدې امله مو څېړنه د لاندینو موخو د پوره کولو لپاره تر سره کړه. 1- د جوارو نباتاتو پر حاصل د نایتروجن کود (سري/امبار) اغېزې. 2- د جوارو پر حاصل او عایداتو باندې د نباتاتو ترمنځ فاصلې اغېزې.


Effect of Plant spacing with different levels of Nitrogen of maize



Effect of Plant spacing with different levels of Nitrogen of maize



Effect of Plant spacing with different levels of Nitrogen of maize



مواد او کړنلاره: یاده څېړنه د جوارو پر حاصلاتو او عایداتو د نباتاتو تر منځ فاصلې او نایتروجن د استعمال اغېزې تر عنوان لاندې د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون په څېړنیز فارم کښې په ۱۳۹۷ ل. کال کې د جوارو پر حاصلاتو او عایداتو د نباتاتو ترمنځ فاصلې او نایتروجن اغېزو ښودلو په منظور تر سره سوه. څېړنه د دولس ترتیمینونو (درې د نباتاتو ترمنځ فاصلې (60x10, 60x20 and 60x30) او څلور د نایتروجن اندازې, N₁: Control, N₂: (50 kg N/ha), N₃: (100 Kg N/ha) and N₄: (150 Kg N/ha). درې تکراره او د سفلیټ پلاټ ډیزاین سره تر سره سوه.

پایله او سپارښتنې: په پایله کېنې د نباتاتو ترمنځ 20 سانتي متره فاصلې او 150 کلوگرامه نایتروجن استعمال تر ټولو ښه ترتیمینټ په ښه سوو چې د تخمونو حاصل (5422) کلوگرامه پر هکتار، پروپو حاصل (9468) کلوگرامه پر هکتار، ټوله عایدات (190977) افغانۍ پر هکتار، خالص عاید (144477) افغانۍ پر هکتار او حاصلاتو او لگښتونو تر منځ نسبت (4.13) په لاس راغلې دي. نو کروندگرو ته سپارښتنه کېږي، چې د جوارو نباتات (20x60 cm) فاصله سره وکړي او د اړینو عناصرو تر څنګ د نایتروجن (150 Kg N/ha) د جوارو کښت او کروندې علاوه کړي، تر څو د مشخصې مخکې (ساحې) څخه د خپل خوښي وړ حاصلات او عایدات په لاس روابي.

د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څېړنو آمریت



د ماش (Vigna radiata L.) NM-94 ورايتي پر وده او حاصل باندې د نايټروجن د بېلابېلو اندازو د استعمال اغېزې



څېړونکي: پوهنمل حمدالله حميم

پېژندنه: څرنگه چې دگران هيواد افغانستان طبعي شرايط د مختلفو کرهنيزو بوټو لپاره مساعد دی چې زيات شمير بوټي په کښي په ښه کميت اوکيفيت روزل کيږي. په دې توگه د حبوباتو د جملې څخه يو هم ماش (می) ده. ماش د پلي لرونکو نباتاتو له جملې څخه يو کلن نبات دی، چې علمي نوم يی (*Vigna radiata*) او د Leguminaceae په کورنۍ پورې اړه لري. د افغانستان جنوب غرب حوزه کې دکرل کيدونکې ځمکې د هغه له جملې په کندهار کې 8.2% ساحه، په هلمند کې 9% ساحه او په ارزگان کې 3.5% ساحه کې شنه ماش کرل کيږي. په اوسط ډول سره په يوه هکتار ځمکه کې 1.2 ټنه تخم توليدوي. په هلمند ولايت کې شنه ماش مستقيماً د تجارت لپاره کرل کيږي، خو د اهلي حيواناتو د غذا په منظور ئې هم کرهڼه رواج لري، چې په 2012 م. کال کې د شنه ماشو د کرلو ساحه 19230 هکتاره وه. (Mohammadi, 2016). که څه هم په اوسني وخت کې بزگران د ماشو لپاره نايټروجن لرونکي سره استعمالوي، خو ولي هغوی د ماش لپاره د نايټروجن د مناسبې اندازې په اړه سم پوهاوي نلري او نه هم په هيواد په تيره بيا د کندهار په ولايت کې په دې اړه، چې د ماش لپاره د نايټروجن د مناسبې اندازې سپارښتنه وکړي، تر اوسه پورې په زياته اندازه څيړنې نه دي ترسره شوي. نو ځکه اړينه ده، چې د کندهار ولايت شرايطو ته په پام سره د ماش د ښې ودې او حاصل لپاره د نايټروجن يوه مناسبه اندازه پيداشي.

مواد او کړنلاره: ياده څېړنه د (ماش می) (*Vigna radiata* L.) د NM-94 ورايتي پر نمو او حاصل باندې د نايټروجن 7 بيلا بيلي اندازي (N0، N15، N30، N45، N60، N75 او N90) کيلو گرام نايټروجن في هکتار) په کې مطالعه کيږي، نوموړې څېړنه په کاملاً اتفاقي بلاک لرونکي ډيزاين (Randomized Complete Block Design) ترسره شوې وه، چې ټول (7) پلاټونه يی درلودل او درې تکراره يی ترسره شوي وو. په مجموعي ډول د ټولي څېړنې د پلاټونو شمير 21 ته رسیده. د نوموړي څېړنې هر پلاټ $3m \times 4m = 12m^2$ مساحت درلوده. د هر تکرار تر منځ فاصله 1m او د هر پلاټ تر منځ 0.5m فاصله په نظر کې نيول شوی وو.

پايله او سپارښتنې: د دغه څيړنې له موندنو څخه په ټوله کې لاندې نتيجه اخيستلای شو: په يو هکتار کې د نايټروجن په اندازه کې تر 45 کيلوگرام پورې زياتوالي سره د ماشو د حاصل اړوند ځانگړنو لکه په يو نبات کې د پليو اعظمي شمېر (23.8)، د زرو دانو اعظمي وزن (49.43 گرامه) او په يو نبات کې د شته دانو اعظمي وزن (9.05 گرامه) هغه وخت مشاهده شوي کله چې په يو هکتار کې 45 کيلوگرام نايټروجن استعمال شوي وو همدارنگه د ماشو د دانې، پروړې او بيولوژيکي حاصل باندې د پام وړ اغېزه کړی وه چې په يو هکتار کې د 60، 75 او 90 کيلوگرام نايټروجن د استعمال سره ورته والي لري. خو د نورو پلاټونو څخه په څرگنده توگه زياتوالي لري. نو لدې امله په کندهار ولايت کې د ماشو د ښې ودې، زيات حاصل او زياتي گني ترلاسه کولو لپاره د ماشو په يو هکتار کرونده کې د 45 کيلوگرام نايټروجن استعمال سپارښتنه کيږي.

د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څيړنو آمريت





په جنوب غرب حوزه کې د کرهڼې پر سکتور باندې د وچکالۍ د بحران اغیزی

پوهنمل خالداحمد یعقوبي^(۱) پوهاند شاه محمود بری^(۲) پوهنوال نصیر احمد نصرت^(۳)

پېژندنه: وچکالۍ یو چاپیریالي پدیده او د اقلیم د بدلون یوه لازمی برخه ده. وچکالۍ کېدای شي په هرځای کې رامنځ ته او د اوبو د کمښت لامل سي. د یادي څېړنې څخه هدف په جنوب غرب حوزه کې د وچکالۍ اغیزی د کرهڼې د سکتور پر بیلابیلو برخو باندې مطالعه ده. په څېړنه کې د پوښتنلیک، بیلابیلو څېړنو، راپورونو، علمي منابعو، محلي تجاربو څخه ګټه اخیستل سویده. یاده ستونزه چې د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې مطالعه سوي پایلو یې ونښودل چې په دې حوزه کې د اړتیا وړ د اورښت اندازه په کلني ډول په منځني کچه ۴۰۰ ملی میتره اټکل سویده، ولې د ۱۱ کلنو د باران د ډیټا د کلني اوسط اندازه ۱۴۶٫۵ ملی میتره ریکارډ سویده، په دې توګه په کلني ډول د اړتیا تر کچې ۲۵۳٫۵ ملیمیتره لږ باران اوریدلي چې په نتیجه کې ۶۳٫۳۴ سلنه د اوبو کمښت منځ ته راغلي دي. علاوه پر دې وچکالۍ ۸۲٪ د ټولنې پر اقتصاد، ۸۲٪ د څارویو او د هغوی پر تولید، ۶۶٪ د سیمې د ژوندیو موجوداتو پر ژوند، ۷۲٪ ترڅمکه لاندې اوبو پر کمښت، ۵۶٪ د کرنیزو تولیداتو د کمښت او سیمې څخه د خلکو د مهاجرت سبب سوي دي. همدارنګه تیرو څېړنو ته په کتنه دا جوته سوه چې د هوا پېژندنې، څارنې او وړاندوینې د مجهزو سیستمونو، نوو ټکنالوژیو، ملاتړ او همکارۍ نه شتون او د اوبو د مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوی کمښت، د پوهې، مهارتونو، محلي تجربو کمښت او امکاناتو کمښت، د ښځو اورګانونو او افرادو ترمنځ نه هم رغې، د اړینو تخنیکي او علمي معلوماتو نه شتون هغه لاملونه دي، چې د ستونزې د پرځای پاته کیدو لامل سوي او د کرهڼې د سکتور پر بیلابیلو برخو یې اغیزه اچولې ده. سپارښتنه مو داده هغه سیمې چې په طبیعي توګه د اوبو محدودې سرچینې لري، هلته د اوبو ښه مدیریت اړین دی، همدارنګه مسؤلین مکلف دي چې د سولر سیستم په واسطه تر ځمکې لاندې اوبو د استعمالولو مخه په قانوني ډول ونیسي.

موخې:

د وچکالۍ د بحران اغیزی د سیمې پر اقتصادي، ټولنیز او چاپیریالي فکتورونو باندې

د وچکالۍ د بحران اغیزی مطالعه د کرهڼې د سکتور پر بیلابیلو برخو باندې

مواد او کړنلارې:

دا څېړنه د ماهیت له نظره کمی او کیفی ده او د څېړنې د نوعیت د لحاظه کډه څېړنه ده، په دې څېړنه کې د بیلابیلو علمي مقالو، مجلو، معتبرو سایټونو او حتی د کلیوالي تجربو څخه استفاده سوي ده. د یادې څېړنې د مطالعې ساحه د افغانستان د جنوب غرب حوزه ده، چې په هغه کې قندهار، هلمند، ارزګان او زابل ولایتونه شامل دي، په یادو سیمو کې ۵۰ پوښتنیاني د نمونې په ډول ویشل سوي، او راټوله سوي ډاټا د (MS XL) سافټویر په وسیله تجزیه او تحلیل سویده.

مطالعه موردي: دغه څېړنه د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې تر سره سوي ده، او په دې برخه کې د بیلابیلو کمی او کیفي ارقامو څخه استفاده سوي ده، د څېړنې د میتودولوژي د لحاظه دا یو ګډه څېړنه ده، په دې څېړنه کې تر ډېره پورې پر محلي تجاربو باندې تکیه سوي ده، او کونښن پر دې سوي دي چې هغه میتودونه، او لارې چارې چې د وچکالۍ سره په مبارزه کې استفاده تري کيږي یادونه وسي.

د ستونزې تحلیل:

الف: په جنوب غرب حوزه کې د کرهڼې پر سکتور باندې د وچکالۍ د اغیزو د پوښتنیانو پایله په

ب: په جنوب غرب حوزه کې د کرهڼې پر سکتور باندې د وچکالۍ د اغیزو د پوښتنیانو پایله په سلنه

ګڼه	پوښتنې	موافق (%)	ناموافق (%)	ناخبر (%)
۱	آیا وچکالۍ د ژوند کولو سیستم (مهاجرت او د کلیو خالي کیدل) په کمیت او کیفیت اغیزه لري؟	۵۸	۳۴	۸
۲	آیا وچکالۍ د کرنیزو محصولاتو د تولید په کمښت باندې زیاته اغیزه لري؟	۸۸	۸	۴
۳	آیا موافق یاست چې وچکالۍ د څارویو د روزنې او تولید په لږېدو باندې اغیزه ښندي؟	۸۲	۱۴	۴
۴	آیا په غلو دانو او لیګیومي نباتاتو باندې د وچکالۍ اغیزه له ورايه معلومېږي؟	۵۶	۳۲	۱۲
۵	د اوبو منظم مدیریت کولای سي چې د وچکالۍ اغیزه لږ کړي؟	۵۰	۳۲	۱۸

ګڼه	پوښتنې	موافق (%)	ناخبر (%)	موافق (%)	منځنۍ (%)	لږ موافق (%)
۱	آیا وچکالۍ تر ځمکې لاندې اوبو په کمښت باندې اغیزه کړېده؟	۷۲	۱۸	۱۰	۰	۰
۲	آیا د سولر سیستم تر ځمکې لاندې اوبو په کمښت کې رول درلودلی دی؟	۳۴	۲۴	۱۰	۳۲	۰
۳	آیا وچکالۍ د سیمې د ژوندیو موجوداتو د کمښت سبب ګرځیدلای سي؟	۶۶	۲۶	۸	۰	۰
۴	آیا وچکالۍ کولای سي چې د سیمې چاپیریالي فکتورونه اغیزمن کړي؟	۱۸	۲۶	۱۶	۴۰	۰
۵	آیا وچکالۍ د ټولنې پر اقتصادي حالت هم اغیزه لري؟	۸۲	۱۴	۴	۰	۰

پایله:

د څېړنې نتایج ونښودل چې په دې سیمو کې د اړتیا وړ د اورښت اندازه په کلني ډول په منځني کچه ۴۰۰ ملی میتره اټکل سویده، ولې د ۱۱ کلنو د باران ډیټا د کلني اوسط اندازه ۱۴۶٫۵ ملی میتره ریکارډ سویده، په دې توګه په کلني ډول د اړتیا تر کچې ۲۵۳٫۵ ملی میتره لږ باران اوریدلي او په همدې اندازه ۶۳٫۳۴ سلنه د اوبو کمبود منځ ته راغلي دي.

موږ چې کومه څېړنه ترسره کړې په جنوب غرب حوزه کې وچکالۍ ۸۲٪ د خلکو یا ټولنې پر اقتصاد باندې منفي اغیزه کړېده. په جنوب غرب حوزه کې د وچکالۍ اغیزو د څارویو او د هغوی پر تولید باندې ۸۲٪ منفي اغیزه کړې، او د هغوی د مرګ ومیر سبب ګرځیدلي یا هم د څارویو د تولید د کمښت باعث ګرځیدلي دي.

په مجموع کې په جنوب غرب حوزه کې ۶۶٪ د سیمې د ژوندیو موجوداتو د کمښت سبب سوي دي. ددې څېړنو پایلو ونښودل چې په جنوب غرب حوزه کې وچکالۍ تر څمکه لاندې اوبو ۷۲٪ کمې کړې، او همدارنګه د سولر سیستم تر څمکه لاندې اوبه ۳۴٪ کمې کړې. همدارنګه ۵۶٪ سلنه د کرنیزو محصولاتو او خلکو د مهاجرت سبب سوي دي.

سپارښتنې:

- هغه سیمې چې په طبیعي توګه د اوبو محدودې سرچینې لري، هلته د اوبو ښه مدیریت اړین دی. د هوا پېژندنې، څارنې او وړاندوینې مجهز سیستم باید شتون ولري.
- د وچکالۍ مطالعه او خبرداری د کرهڼې د مسلک پوهانو، ملي او سیمه ایزو پلان جوړونکو د اساسي وړتیاوو څخه ده، باید اقداماتو ته یې فکر وسي.
- د جنوب غرب حوزې مسؤلین دي د وچکالۍ د مخنیوي او د هغه سره د مبارزې په منظور و کروندګرو ته د عامه پوهاوي په موخه روزنیز پروګرامونه جوړ کړي.
- مسؤلین مکلف دي چې د سولر سیستم په واسطه تر ځمکې لاندې اوبو د استعمالولو مخه په قانوني ډول ونیسي.
- دولتي مسؤلین باید د پوهنتونونو او څېړنیزو مرکزونو څخه د وچکالۍ سره د مبارزې تر عنوان لاندې طرحه وغواړي او هغه طرحه باید په کلیو، ولسوالیو او ښارونو کې عملي کړل سي.



د خطي سیستم په استعمال سره د ترانسپورتي قیمتونو ټیټوالی

څیړونکی: پوهنمل میرویس یحیی زی

پېژندنه: انتقالاتي مسئله (Transportation Problem) د خطي پروگرام یو فرعي سیټ دی چې هدف یې د بیلابیلو اجناسو او اموالو لیرد له بیلابیلو منابعو څخه بیلابیلو ځایونو ته په داسې شکل دی چې وکولای شي د انتقالاتو مصارف راکم او د ضرورت او غوښتنې مطابق اجناس ورسوي. ترانسپورتي مسأله په لوړې ځل د امریکا د پوځي متخصصینو لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال مختلفو ځایونو ته د پوځیانو او تجهیزاتو استولو په موخه را منځ ته شوه او هدف یې د مصارفو کموالی و. دانتقالي مسئلې د حل لپاره باید د تولید او مصرف د ځایونو ترمنځ د مصرف ضرائب معلوم وی او په دې هکله مخکني معلومات موجود وي.

د هر تجارت لپاره د تولیداتو مؤثر انتقال او ترانسپورت د تولید له ځای څخه د تقاضا تر ځای پورې ډیر مهم دي. د اجناسو او تولیداتو انتقال مارکیټ ته په کمو ترانسپورتي لګښتونو سره د کمپنۍ مفاد زیاتوي او د ډیرو تولیداتو وړتیا ورکوي.

موندنې

Destination Sources	D_1	D_2	...	D_i	...	D_n	Capacities of the sources
F_1	$x_{11}(c_{11})$	$x_{12}(c_{12})$	...	$x_{1i}(c_{1i})$	...	$x_{1n}(c_{1n})$	a_1
F_2	$x_{21}(c_{21})$	$x_{22}(c_{22})$	...	$x_{2i}(c_{2i})$	...	$x_{2n}(c_{2n})$	a_2
...	...	...	...	...	...	...	...
F_i	$x_{i1}(c_{i1})$	$x_{i2}(c_{i2})$	...	$x_{ij}(c_{ij})$	...	$x_{in}(c_{in})$	a_i
...	...	...	...	...	...	...	...
F_m	$x_{m1}(c_{m1})$	$x_{m2}(c_{m2})$	...	$x_{mj}(c_{mj})$	...	$x_{mn}(c_{mn})$	a_n
Requirements	b_1	b_2	...	b_i	...	b_n	$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$

د ترانسپورتي مسئلې د حل عمومي فارمټ

Destination	D_1	D_2	D_3	D_4	Supply	Penalties
F_1	11(25)	13(225)	17	14	250	(2)
F_2	16(175)	18	14	10(125)	300	(4)
F_3	21	24	13(275)	10(125)	400	(3)
Demand	200	225	275	250	$\sum = 950$	
Penalties	(5)	(5)	(1)	(0)		

$$x_{11} = 25, x_{12} = 225, x_{21} = 175, x_{24} = 125, x_{33} = 275, x_{34} = 125$$

مجموعي ترانسپورتي قیمت یې

$$= 12,075$$

د وګل میتود په واسطه د مسئلې حل

مواد او کړنلاره: دا څېړنه (د خطي سیستم په استعمال سره د ترانسپورتي قیمتونو ټیټوالی) تر عنوان لاندې یوه کتابتوني څېړنه ده چې د معتبرو او نویو تحقیقي مقالو، معتبرو او مؤثرو کتابونو څخه استفاده شوې او د مخکنيو څېړونکو موندنې، پایلې او نتایج را غونډ او د یوې علمي څېړنې د اصولو له مخې ورڅخه استفاده شوې ده.

پایله او سپارښتنې: د مقداري انالیز (Quantities Analysis) یوه مهمه کارېدونکې ساحه په تجارتي مسائلو کې د تولیداتو انتقال او توزیع ده چې د ترانسپورتي مسئلې په نوم هم یادېږي. په عامه توګه د هرې ترانسپورتي مسئلې لپاره ممکنه حل موجود دی خو د مطلوب حل د شتون لپاره ضرور ده چې د تولید او تقاضا اندازه برابره وي. د ترانسپورتي مسئلې لپاره ځینې محدودیتونه شتون لري چې یو یې هم کیدای شي د ترانسپورتي مسئلې د نامعادلوالي په صورت کې د مطلوب حل نه موجودیت دی. همدارنګه کیدای شي، چې له داسې ترانسپورتي مسئلې سره مخ شو چې په عامو میتودونو حل ونلري، په داسې صورت کې کولای شو له خپلو تجربو، محلي میتودونو او تګلارو څخه استفاده وکړو. ددغه تحقیق څخه په استفاده ویلای شو چې د ذکرشو میتودونو

(North-West corner method, lowest cost entry method (Method of matrix-minima), Unit cost-penalty method (Vogel's approx. Method), Unit cost-penalty method (Vogel's approx. Method) دی او په دغو میتودونو د عین مثال په حل مو ولیدل چې Unit cost-penalty method (Vogel's approx. Method) څخه تر ټولو مطلوب حل په لاس راغی. وړاندیز کېږي چې په ترانسپورتي مسئله او د خطي پروګرام د استفادې اړوند نور تحقیقات هم وشي تر څو لا مؤثر میتود رامنځ ته کړو.




د کندهار ولایت د غوښپنو چرگورو فارمونو په تولید باندې د روزنې د مدیریت اغېزې

څېړونکي: پوهنمل نعيم جان عادل

پېژندنه

د مرغدارۍ صنعت پراختیا او د فارمونو جوړونه د یوه هیواد د اقتصاد په وده او پرمختګ کې ځانګړی ارزښت لري. ځکه د دوي وده چټکه ده ژر په حاصل راځي او د محصولاتو د پلور له لارې نه یواځې کورنۍ بلکې ملي اقتصاد سره مرسته کوي. په دې سره د چرگورو غوښه او د هغوی څخه لاسته راغلي وړ محصولات د اړینو مغذي موادو په درلودلو سره د انسانانو لپاره ارزښتناکه او باکیفیته خواړه ګڼل کیږي. ددې څېړنې اهمیت دادی چې په فارمي سطحه به د چرگورو د روزنې په برخه کې مدیریتي، مسلکي او تخنیکي ستونزې روښانه، د نورو څېړنو لپاره به لومړنۍ معلومات او ارقام وي او همدارنګه د ښځو د ښوونې د لارو د پیاوړتیا لپاره به یې مرسته کوي. ددې څېړنې اصلي موخې په کندهار ولایت کې د غوښپنو چرگورو د فارمونو د روزنې د مدیریت ارزونه، د غوښپنو چرگورو فارمونو په تولید باندې د ښه، متوسط او کمزوري مدیریت ترمنځ د اغېزو پرتله کول دي. د یادې څېړنې ستونزې په فارمونو کې، د ناروغیو شتون، د خوراکي لوړه بیه او کموالي، په مارکېټ کې د چرگورو زیاتوالي، بې کیفیته د هګیو زړې چرګو واردېدل، د وسایلو نشتون، د هېچرې نشتون، د وطنوالو کمزوري اقتصاد، بې کیفیته یو ورځني چرگورو واردول، په مسلکي ډول د فارمدارانو نه روزل، د بهرني ملکونو څخه د (Breeder) او کارتنې چرګانو د غوښې راوړل، دولت لخوا یاد صنعت ته نه پاملرنه، د درملو خراب کیفیت او لوړه بیه د یادې څېړنې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي. د څېړنې په بهیر کې ټولې ستونزې په ګوته، او د حل لارې چارې ورته په ملي او نړیواله کچه وپاندې شوي او ددې معلوماتو څخه د غوښپنو چرگورو فارم لرونکي، مسلکبان، استادان، زده کوونکي او ټول مینه وال ګټه اخیستلای شي.

موندنې



(۱) ګراف: د څېړنې د ټولو ورکړل شویو پراوترنو منځني حدونه.



(۱) شکل: په فارمونو کې د چرگورو مختلف نسلونه (%). (۲) شکل: په فارمونو کې قریظین (%).

(۱) جدول: د څېړنې په ساحه کې د فارمدارانو د ستونزو کچه.

د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه
د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه
د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه	د چرگورو د فارمونو د ستونزو کچه

مواد او کړنلاره

د څېړنې پیل اوځای

دا څېړنه په ۱۴۰۰ ل. کال د مرغومي میاشتې په ۱۵ نیټه د کندهار ولایت (مرکز)، ارغنداب، دامان، پنجوايي، ډنډ او تخته پل ولسوالیو د غوښپنو چرگورو په ۱۸ باب فارمونو کې د کندهار ولایت د غوښپنو چرگورو فارمونو په تولید باندې د روزنې د مدیریت اغېزې تر سر لیک لاندې پیل او د ۱۴۰۱ ل. کال د چنگاښ میاشتې پر ۱۰ نیټه پای ته ورسیده.

د څېړنې ډیزاین: دغه څېړنه د توصیفی (Descriptive) څېړنې د میتود څخه په استفادې د پوښتنیایي د میتود (Questionnaire method) پواسطه پر مخ وړل شوې ده. د ارقامو او اندازو راټولونې په طریقې کې له فارمدارانو سره مخامخ لیدنې، مرکې، د پوښتنیایي ویشل او داسې نورو وسیلو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د تر لاسه شوو ارقامو تحلیل او تجزیه د (MS excel) او احصایو میتودونو پواسطه ترسره شوې. د مقداري ارقامو اعلی، ښه او کمزوری ټکي په سلنې (%) سره په جدول، ګراف او شکل کې ښودل شوي.

پایله او سپارښتې

د څېړنې پایلې ښیي چې کندهار د ښه موسمونو په درلودلو سره د مرغدارۍ صنعت لپاره یو ښه او مناسب ولایت دی اما عمده ستونزه د مرغدارۍ د نه پرمختګ لپاره په مارکېټ کې د درملو د کیفیت ټیټوالی، د خوراکي یا دانو لوړه بیه، د حکومت د پاملرنې او مرستو نه شتون، په بازار کې د چرګانو د غوښې ټیټه بیه، د مناسب مارکېټ نشتون، د چرګانو په مارکېټ کې د مافیا شتون، د پاکستان هیواد څخه د بې کیفیتو موادو واردول، د یاد ولایت د فارمونو د حاصلاتو د رسیدو په وخت کې د پاکستاني غټو تجارانو لخوا نرخونو ته نوساني ښکته والی، د فارم لرونکو نه مسلکیتوب، د مدیریتي چارو ښه نه تر سره کول هغه لاملونه وه، چې د غوښپنو چرگورو فارمونو پر تولید او پرمختګ باندې یې ځانګړی تاثیر درلود، په یاده څېړنه کې فارمونه د مدیریتي او اقتصادي چارو په نظر کې نیولو سره په څلورو کټګوریزو ویشل شوي وو، لومړۍ هغه فارمونه چې د ښه مدیریت لرونکي وه او تولید یې هم ښه وو د ۳۰ ورځني عمر چرگورو ژوندی وزن یې ۱٫۵-۱٫۷ کيلو ګرامه پورې وو. ۸۹٪ په فارمونو کې د چرگورو ناروغۍ ونه لیدل کیدل، او ۱۱ سلنه فارمونو کې ناروغۍ شتون درلود.

- د مرغدارۍ یو ملي یا صلاحیته بورډ باید جوړ شي تر څو په مختلفو او مناسبو وختونو کې ناستي ولري
- داخلي محصولاتو ته باید په داخلي قراډونو کې توجه وشي، په وارداتي توکو باندې خاصاً د مرغدارۍ په برخه کې د قوي کنترول راشي
- د پاکستاني فارمونو د تولیداتو مداخله په مارکېټ کې باید منع شي او دولت باید د داخلي فارمونو سره د بازار په پیدا کولو کې مرسته وکړي.
- د خارجي هیوادونو څخه د بې کیفیتو (breeder) چرگورو او کارتنې غوښو راوړل په اړه باید دولت تصمیم ونيسي



۱ شکل فاصله ژنتیکی نمی با استفاده از نشانگر ISSR



د کندهار ولایت د اتمې ناحیې په کلیوالي سیمو کې د کلیوالي اقتصاد په پراختیا کې د اجتماعي

سرمایې رول

څېړونکي: پوهنیار اسدالله سعادت

د گټو د ترلاسه کولو په منظور د افرادو یا کورنیو تر منځ اړیکو ته اجتماعي سرمایه ویل کیږي. د هغو خلکو ترمنځ اړیکې چې په یوه ځانګړي ټولنه کې ژوند کوي او ګډ کار سره کوي، د دوي دا ګډ کار د ټولنې پر ښوالي باندې مؤثر تمام سي اجتماعي سرمایه بلل کیږي. اجتماعي سرمایه د کلیوالو د ژوند په پراختیا او انکشاف کې ډېره مهمه ده، د کلیوالي ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لوبوي، دا سرمایه د زیات اقتصادي اهمیت درلودونکې ده داسې چې د اقتصادي پراختیا سره نژدې اړیکې لري. کلیوالي اقتصاد په کلیوالي سیمو کې د اقتصادي ښوالي او د ژوند د کیفیت د ښوالي و پروسې ته ویل کیږي، داسې چې د بېلابېلو ستراتیژيو د پلي کولو له لارې چې اقتصادي وده وهڅوي، کاري فرصتونه رامنځته کړي، د عاید کچه لوړه کړي، او دوامداره پرمختګ ته وده ورکړي. کلیوالي اقتصاد د کلیوالي سیمو د اقتصادي فعالیتونو او شرایطو څخه بحث کوي چې په هغه کې د توکو او خدماتو تولید، ویش او مصرف شامل دي. اجتماعي سرمایه په ټولنه کې د افرادو ترمنځ د همکارۍ او باور له لارې د ټولنې یووالی ته وده ورکوي، ډلبنز تصمیمونه اسانه کوي، ټولنیزې اړیکې قوي کوي. د ټولنیزې سرمایې له لارې کلیوالي وګړي کولای شي چې خپل په منځ کې سرچینې او پوهه شریکه کړي تر څو ددې لارې خپل اقتصادي فعالیتونه تأمین کړي، زراعتي کړنو ته پرمختګ ورکوي، د ټولنې د عمومي اقتصادي ودې لامل کیږي. اجتماعي سرمایه په کلیوالي سیمو کې کوچنۍ سوداګرۍ ته وده او پراختیا ورکوي، معلوماتو ته لاسرسی اسانه کوي، د کلیوالو ترمنځ د متقابل عمل له لارې فعالیتونه منظموي، اجتماعي سرمایه د کلیوالو ترمنځ د اقتصادي او اجتماعي بحران څخه د خوندیتوب سبب کیږي. د هیواد اقتصاد تر ډېره حده پر کلیوالي اقتصاد باندې ولاړ او کلیوالي اقتصاد د اجتماعي سرمایې سره نه بیلیدونکې اړیکې لري، اجتماعي سرمایه د کلیوالي اقتصاد په پرمختګ کې زیات رول لري، ولې په دې برخه کې کافي څېړنې نه دي سوي، او نه داسې چې په پراختیایي پالیسیو جوړونکو په پروګرامونو کې مناسب ځای ورکړل شوی، په دې برخه کې باید لازمي څېړنې وې ترڅو د پراختیایي پالیسیو توجه ورته را وواړي او په خپلو پراختیایي پالیسیو کې ددې سرمایې څخه لازمه استفاده وکړي، په همدې موخه داڅېړنه طرح سويده چې هدف یې د کلیوالي اقتصاد په پراختیا کې د اجتماعي سرمایې د رول معلومول دي.

د کلیوالي اقتصاد د فکتورونو په پرمختیا کې د اجتماعي سرمایې اهمیت

درجه بندي	رتبه ای اوسط	انحراف معیار	حسابي اوسط	اقتصادی فکتورونه
1	8.23	1.14206	4.5962	د پوهې او مهارتونو شریکول
2	8.03	1.05433	4.5769	د پانګوونې او د کلي څخه د بهرنۍ مرستې جذبول
3	7.98	1.1759	4.5962	په کلیوالي ټولنه کې د ټولنیز ژوند د کیفیت لوړول
4	6.96	1.34352	4.1346	د مساجدو او عامه ځایونو جوړول
5	6.85	1.18245	4.1154	د کرنیزو او کلیوالي صنایعو پیاوړتیا
6	6.61	1.26563	3.9231	په ګډه د ویاړ او نهرونی پاکول
7	6.55	1.21516	3.8846	د عامه خدمتونو وړاندې کول او ښه کول
8	5.96	1.30783	3.7692	یوه بل سره په همکارۍ او مشوره سره د کرنیزو بندونو جوړول
9	4.32	1.11753	2.9231	سوداګریزو شرکتونو ته لاسرسی
10	2.75	0.81349	2.25	د راکړې ورکړې د لګښتونو کمول
11	1.77	0.74981	1.7115	کریډیټ او تمویل ته لاسرسی

کلیوالو ته زیان رسونکي عوامل

موارد	زیاتوالی فیصدي	بیله بدلونه فیصدي	کموالی فیصدي
د کښت لاندې مخکې او د کرنیزو محصولاتو تولید	15.4	46.2	38.5
د حیواناتو شمیر او د حیواني محصولاتو تولید	32.7	42.3	25.0
زیات ګټه لرونکي کاري فرصتونه	9.6	30.8	59.6
تورم او ګرانې	26.9	36.5	36.5
د اوبو سرچینې، سیندونه او ځاټان	9.6	21.2	69.2
رش او د نفوس زیاتوالی	46.2	26.9	26.9
حیواني زراعتي ناروغۍ او آفات	36.5	46.2	17.3
د کورنیو دننه اړیکې	32.7	46.2	21.2
د بشري کاري قوې مهاجرت وښارونو ته	42.3	30.8	26.9
و محلي ارزښتونو او کلتور ته پابندیت	28.8	36.5	34.6

داڅېړنه د افغانستان د کندهار ولایت د اتمې ناحیې په کلیوالي سیمو کې ترسره سويده، د معلوماتو (ډاټا) د راټولولو له مخې ساحوي څېړنه ده، په دې څېړنه کې معلومات د پوښتنایي په واسطه سره راټول شوي دي، پوښتنایي څو برخې درلودلې چې په هره برخه کې په کافي اندازه سره پوښتنې د ځواب ویونکو څخه شوي دي.

د کندهار ولایت (۸) ناحیه یو شمیر کلي لري، د څېړنې د معلوماتو (ډاټا) د راټولولو لپاره د (کوکران، شامی او باغ پل) لوي کلي انتخاب شويدي. په دغو کلیو کې هغه کلیوال وګړي چې په همدې کلیو کې د پخوا څخه اوسېږي او ددې سیمې اصلي اوسیدونکي وي، تر دقیقې شمیرنې وروسته تقریباً (۶۰) کورنیو ته ورسیدل، د مورګان (۱۹۷۰) جدول په اساس باندي (۵۲) دانې پوښتنایي انتخاب او په تصادفي ډول پرې ډکې شويدي.

په لومړي قدم کې په (SPSS26) سافټویر کې پر ډاټا باندي د الفا کرناخ ټیسټ ترسره چې مطلوب ضریب یې په لاس راوړ. وروسته ډاټا د (SPSS26) په واسطه تحلیل شوي، چې د فریکونسي، اوسط، فیصدي او نورو لومړنیو تحلیلونو سره سره د فریدمن ټیسټ هم د دقیقې محاسبې لپاره اجرا شويدي.

پایله ښیي چې اجتماعي سرمایه د کلیوالي اقتصاد په پرمختیا کې د ځانګړي اهمیت درلودونکې ده، اجتماعي سرمایه د اجتماعي پرمختګ، کلیوالي پراختیا، عامه نظم او د ملي شتمنیو په ساتلو او حفاظت کې خاص رول لري. په کلیوالي سیمو کې باور او عامه اړیکې د اجتماعي سرمایې د انکشاف او کلیوالي اقتصاد د پرمختیا سبب کیږي. د کلیوالي اقتصاد د فکتورونو په پراختیا کې اجتماعي سرمایه ځانګړی اهمیت لري. کلیوال و ګړي یو له بل سره د اجتماعي گټو په منظور خپله پوهه او سرچینې شریکوي او یو له بل سره په کرنیزو فعالیتونو کې زیاته همکاري کوي، پایلې وښودل چې کلیوال وګړي د یو له زیان رسونکو عواملو سره هم مخ کیږي، همدارنګه د څېړنې په پایله کې روښانه شول چې ناوړه دودونه او رواجونه او په اړوند ادارو کې پراخ فساد د اجتماعي سرمایې په وړاندي د مهمو خنډونو څخه دي. په دې برخه کې یو له وړاندیزونه په لاندې ډول دي:

- د کلیوالي سیمو اقتصادي پالیسی جوړونکي باید د خپلو پالیسیو په جوړولو کې اجتماعي سرمایې ته خاص ځای ورکړي.
- مسئولین باید د اجتماعي سرمایې په وړاندي ننگوني حداقل ته ورسوي، تر څو په اسانۍ سره د کلیوالي سیمو پراختیا رامنځته شي.
- مسئولین باید د اجتماعي سرمایې د پراختیا لپاره په کلیوالي سیمو کې دوامداره ستراتیژۍ په لاره واچوي.

د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څېړنو آمریت




په وطني نسل وزو کې د شیدو ورکولو مختلفو وختونو کې د وینې د کلسیم او

گلوکوز اندازه

څیړونکي: پوهنیار حسن الله عرفان

پېژندنه: د ښځینه تي لرونکو حیواناتو د تیونو د غدواتو څخه د شیدو ترشح کیدل (Lactation) څخه عبارت دي. د شیدو ورکولو دوره کې اوکسي توسین او پرولکتین ډیر رول لري د شیدو ورکولو په مرحلو (لمړنۍ، منځنۍ او وروستۍ مرحلو) کې د شیدو حاصل او د شیدو ترکیب توپیر کوي او همدارنګه د وینې په بیوشیمیکي پارامترونو تاثیر لري. زیاتو څیړنو په دې وروستیو څو کلونو کې ښودلې چې د وینې بیوشیمیکي پارامترونه په کوچنیو شخوند وهونکو حیواناتو کې د زیاتو فکتورونو په واسطه تر اغېزې لاندې راځي لکه عمر، موسم او نسل. د شیدو جوړښت د یو تعداد فکتورونو پواسطه تر تاثیر لاندې راځي لکه د شیدو ورکولو مرحله، د شیدو ورکولو شمیر، نسل، د غذا ډول، محیط او د غولانځي مریضي حالت. د شیدو ورکونکو وزو لپاره سخته ده چې د قناعت وړ غذايې شرطونه ورته پوره کړو ځکه چې وزې د شیدو جوړولو لپاره په زیاته اندازه انرژي او منرالونو ته ضرورت لري. په نتیجه کې د حیواناتو په میتابولیزم کې د پام وړ تغیرات منځته راځي او د وینې د سپروم په بیوشیمیکي پارامترونو او د منرالونو په غلظت کې تغیرات رامنځته کيږي. دغه تغیرات نه یواځې د حیواناتو فعالیت متاثره کوي بلکه د ځانګړو میتابوليکي ناروغیو لامل هم ګرځي. د وینې په بیوشیمیکي پارامترونو د تولید مثل د مختلفو دورو تاثیراتو په اړه ډیرې څیړنې په پسونو او وزو کې ترسره شوي دي. د دې څیړنې موخه د شیدو ورکولو دوده کې د کلسیم او گلوکوز د اندازه معلومول دي، همدا ډول د دې څیړنې اهمیت دا دي تر څو د شیدو ورکولو په دوره کې د وینې د کلسیم او گلوکوز اندازه سره پرتله شي.

موندنې



ګراف: د شیدو ورکولو په مختلفو وختونو کې د کلسیم او گلوکوز اندازه رښايي

حاصل برخې

شیدو ورکولو دوره			پارامترونه
60 th day	40 th day	20 th day	
10,320±0,645	8,382±0,512	9,801±0,660	کلسیم
51,317±2,58	54,074±1,91	57,384±1,67	ګلوکوز

پورتنی جدول د شیدو ورکولو د دورې په 20 مه، 40 مه او 60 مه ورځ د وینې سپروم د کلسیم او گلوکوز اندازه په جلا جلا ډول ښودل شوي دي.

مواد او کړنلاره

دا څېړنه د ننگرهار پوهنتون د وترنري علومو پوهنځي د پري کلینیک څانګې په لابراتوار کې ترسره شوې ده چې د وزو د شیدو ورکولو دورې په 20 مه، 40 مه او 60 مه ورځ د وینې نمونې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ کې د ټولو حفظ الصحی شرایطو په نظر کې نیولو سره راټولې شوي دي چې داڅیړنه د قرغیو ولسوالۍ په وطني وزو کې چې د شیدو ورکولو په دوره کې وې د 1399/12/1 څخه شروع او تر 1400/2/31 تاریخ پورې پای ته ورسیده او لاسته راغلي ارقام د (SPSS) سافټویر (One-way-ANOVA) په واسطه تحلیل شول.

کلسیم او گلوکوز:

(Calculation = Test ÷ Standard × 10) په پایله کې لاسته راغلې اندازه (mg/dl) سره وښودل شوه او (total calcium test) او (digital photo calorimeter) میتود څخه کار اخیستل شوی دي.


پایله اخیستنه:

نتیجې وښوده چې د شیدو ورکولو دوره د وینې په پارامترونو د پام وړ اغیزه درلوده کله چې د شیدو ورکولو د دورې 20 مه، 40 مه او 60 مه ورځ سره مقایسه شول ($P < 0.05$) چې په 60 مه او 40 مه ورځ نسبت 20 مې ورځې ته په گلوکوز کې د پام وړ ($P < 0.05$) کموالی راغلی وو. په وزو کې د شیدو ورکولو د دورې په اولو 20 او 40 ورځو کې میتابوليکي موادو کموالی ښیي چې د وزو د لنگون په وخت او د شیدو ورکولو د دورې په اوله مرحله کې د ناروغیو د واقع کیدو چانس شته چې د ناروغیو د واقع کیدو په صورت کې زیات اقتصادي تاوانونه مالدارانو او ټولنې ته رسیږي.


مالدارانو ته وړاندیزونه:

- هغه حیوانات چې شیدې ورکوي د هغوي په غذا کې کلسیم لرونکي منابع باید زیاتې استعمال شي تر څو حیوانات په هایپوکلسمیا اخته نشي.
- حیواناتو ته بیلا نښ شوی خوراک ورکړل شي تر څو د شیدو ورکولو په مرحله کې د منرالونو او نورو اړینو موادو د کمبود سره مخ نشي.
- د ګرانو مالدارانو څخه هيله کوم چې حیواناتو ته په خوراک کې (D.C.P) علاوه کړي.

د تازه اوبو سرچینې مخ په کمیدو دې او د دی توان نلري چې د ډیریدونکي نفوس لپاره دی بسنه وکړي او د بلی خوا د ښارونو تولیدسوي فاضله اوبو حجم د نفوس د ودې، ښاري کیدو او ټولنیز اقتصادي ودې سره سم نور هم زیاتېږي. همدارنګه د بدلیدونکې اقلیمي شرایطو په نظر کې نیولو سره په وچو سیمو کې د حرارت درجه لوړېږي چې په نتیجه کې و زیاتو اوبو ته اړتیا پیدا کوي. د اوبو کمښت، اقلیمي بدلون او د ښاري اوبو زیاتوالي بزرګران دې ته اړ کړي چې د اوبو لګولو لپاره فاضله اوبه بیا وکاروي که څه هم دا کړنې د ځینو فایده برسیره د ایکوسیستم او ژوندیو مخلوقاتو لپاره ډیرې وچاوونکې پایلې رامنځته کوي. د فاضله اوبو په استعمال سره د منحل موادو لوړه کچه په خاوره کې پاته کیږي او د ککړتیا په خپریدو کې مرسته کوي. ډیرو فکتورون نه شتون لري چې د محصولاتو د کیفیت د ټیټوالي سبب ګرځي چې تر ټولو مهم یې د خاورې په ځانګړتیاوو او په ځانګړې توګه د ایباری په موخه دا استعمالونکو اوبو په ځانګړتیاوو پورې مستقیم تړاو لري. د فاضله اوبو اوږدمهاله اوبه لګول د خاورې ځانګړتیاوې اغیزمنه وي او د خاورې د ککړتیا سبب ګرځي چې په حاصلاتو کې د درنوفلزاتو د زیاتې تجمع لامل کیږي. د زیاتو درنوفلزاتو لرونکې غذایی موادو اوږدمهاله استعمال روغتیا ته زیان رسوي او د مړي سبب ګرځي. دا چې غذایی خوندیتو نن وڅ په نړیواله کچه یوه مهمه مسله ده نو دا اړینه ده چې د فاضله اوبو په وسیله تولید سوي محصولات مطالعه کړل سي او د درنوفلزاتو اندازه یی د نړیوال معیار سره مقایسه سي ترڅو د کرنې دوامداره پراختیا ته وده ورکړل سي د غذا خوندیتوب محفوظ وي.



شکل 1. د خاورې په نمونو کې د درنو فلزاتو اوسط اندازه. ټولی کچې د خوندي اندازه څخه ښکته دي او یوازې Pb ځینې ککړتیاوې ښودلې، او د FAO لخوا تعریف شوي د Fe, Zn, Cu, Mn د اوبو لپاره په ترتیب سره 2000, 270, 300, 1500 او 30-50 غلظت (mg/kg) تعین کړل سي.



شکل 2. په نباتاتو کې د درنو فلزاتو اندازه د حاجي عرب (HA)، بالاګرز (BKZ)، محل نجات (MN) او چهارباغ (CB) په سیمه کې. د نړیوالو ادارو لخوا د خاورو لپاره د Fe, Zn, Cu, Mn د اوبو لپاره په ترتیب سره 2000, 270, 300, 1500 او 30-50 غلظت (mg/kg) تعین کړل سي.

مواد او کړنلاره: د موضوع پیژندنې او اهمیت ته لنډه کتنه، د ستونزې بیانول او موخ

د کندهار ښار په جنوب (بالاګرز، حاجی عرب، محل نجات) کې د فاضله اوبو ایبار ترسره کیږي او تر اوسه د دی عمل ارزښتی لپاره کومه څېړنه نه ده ترسره شوې. له همدې امله، د فاضله اوبو لخوا خړوب شوي ځایونه څخه د څېړنې د موخې سره سم د اوبو، خاورې او تولید کیدونکو نباتاتو د خوړوېرځي راټولې سوي او د درنو فلزاتو (Zn, Pb, Cu, Mn, Fe) مقدار پکې مطالعه سي. همدارنګه، ماخذ په صفت د چهارباغ سیمه چې پاکي او به استعمالوي د اوبو، خاورو او نباتاتو نمونې راټولې سوي دي. د اوبو، خاورې او د اتو (8) نباتاتو سمپلونه د (wet digestion) میتود په واسطه هضم شوي او بیا یی د یادو درنو فلزاتو مقدار د (AAS) دسګاه په وسیله معلوم شوي.

د څېړنې پایلې دابنې یی چې د سیمې ټولې فاضله اوبه د پاکو اوبو سیستمونو ته داخلېږي. د اوبو، خاوره او بوټو په نمونو کې د Fe, Cu, Mn او Zn کچه "غیر خطرناک" ګڼل کیږي، پداسې حال کې چې د خاورې او نباتاتو په نمونو کې د Pb غلظت د نړیوال معیار څخه زیاته وه که څه هم تولیدات د پاکو اوبو په وسیله تولید سوي وه. که څه هم په نباتاتو کې د Fe, Cu, Mn او Zn کچه له نړیوال معیار څخه زیاته نه وه، مګر که چیرې د فاضله اوبو ایباری د اوږدې مودې لپاره عملي شي، درانه فلزات کیدای شي په راتلونکي کې له نړیوال معیار څخه لوړ سي.

دولت او چارواکي باید پر جدي ستراتیژي باندې غور وکړي ترڅو داد ترلاسه سي چې تازه اوبو کاناوونو د ککړتیا څخه محفوظ سي. همدارنګه دا وړاندیز کیږي چې د فاضله اوبو بیا کارول د زینتي بوټو لپاره استعمال سي یا دا چې په ښاري سیمو کې تولید شوي اوبه د بیاکارولو څخه مخکې په صحیح شکل درملنه سي او د ککړتیا د لیرې کولو لپاره مناسب واحدونه تاسیس سي. په ورته وخت کې، د فاضله اوبو د درملنې او خوندي بیا کارولو په اړه ښه پالیسي او قانون جوړل کړل سي.



د ممپلیو په دوه ورايتیو باندي د فاسفورس د استعمال اغيزې

څيړونکي: پوهنيار رحمت الله نذير

پېژندنه: ممپلی چې علمي نوم يې (*Arachis hypogaeae L*) دی يو له ډيرو مهمو ليگيومي نباتاتو له جملې څخه دي. د غذايي موادو له جملې څخه په زياته اندازه پروتين، نباتي غوړي، ويتامينونه او منرالونه لري. ممپلي د نړۍ ديارلسم مهم نبات دی، د نباتي غوړيو د توليد له مخې څلورم مقام او د نباتي پروتين په اساس دريمه درجه نبات گڼل کيږي. ممپلي 50% د خوراک وړ غوړي، 25% د هضم وړ پروتين لري او 20% د کاربوهايډريت درلودونکي دی. نوموړی نبات د نړۍ په استوايي، نيمه استوايي او گرمو سيمو کې کرل کيږي، په نړيواله کچه يې د کښت لاندې ساحه 31.57 ميليون هکتاره ده چې ورڅخه په مجموعي ډول 53.64 ميليونه ټنه د دانې توليد ترلاسه کيږي. د دانې اوسط توليد يې 1.69 ټنه پر هکتار دی. د دوامداره کرنې په اساس د خاورې د حاصلخيزۍ کمزوري کيدل د نباتاتو د توليد په وړاندې يوه له عمده ستونزو څخه گڼل کيږي، فاسفورس يو له هغو عناصرو څخه گڼل کيږي چه د افغانستان په شمول د نړۍ اکثریت سيمې يې د قلت سره مخامخ دي، فاسفورس د ليگيومي نباتاتو، خاصا د پليو په توليد کې يو له ډير تاثیر کوونکو عواملو څخه عبارت دی، ځکه چې، ليگيومي نباتات د اړتيا وړ نايتروجن د رايوېم بکټرياوو په مرسته نصبولی او له هغې څخه استفاده کولی شي، دا ډول نباتات تر ډيره د فاسفورس پوره اندازې ته ضرورت لري. د ممپليو په توليد کې د فاسفورس اهميت ته په کتو مو نوموړې څيړنه (د ممپليو په دوه ورايتيو باندي د فاسفورس د استعمال اغيزې) تر عنوان لاندې څيړنه ډيزاين او ترسره کړه ترڅو په هيواد کې بالخصوص د کندهار په اقليمي شرايطو کې د ممپليو په توليد باندي د هغوی اغيزې مطالعه کړل شي او د ممپليو د غوره حاصل ترلاسه کولو په هدف د فاسفورس يوه مشخصه اندازه وټاکل شي.

موندنې

(?) جدول 1: ممپلي و پر وده باندې د فاسفورس د مختلفو اندازو اغيزې

Treatment	Plant height (cm)	Plant dry weight (g plant ⁻¹)	Number of main branches plant ⁻¹	Leaf area index at 90 DAS
Varieties Kormaki-V₁				
Paparr-V ₂	29.5	17.8	4.2	2.4
CD (P=0.05)	29.9	26.6	4.9	2.6
	NS*	1.6	0.34	NS*
Phosphorus doses				
P ₀	29.3	20.2	4	2.1
P ₄₀	29.3	21.7	4.5	2.3
P ₈₀	30.1	24	4.7	3.1
P ₁₆₀	30.1	22.9	4.7	2.6
CD (P=0.05)	NS*	0.9	NS*	0.5
Interaction (VxP)				
CD (P=0.05)	NS*	NS*	NS*	NS*

(?) جدول 2: ممپلي و حاصل پر شاخصونو د فاسفورس د مختلفو اندازو اغيزې

Treatment	Number of pods plant ⁻¹	Pods weight plant ⁻¹	100 kernel weight (g)	Shelling percentage
Varieties				
Kormaki-V ₁	14.1	9.6	42.2	71.2
Paparr-V ₂	20.9	44.7	77.1	69.4
CD (P=0.05)	6.4	6.6	8.0	0.8
Phosphorus doses				
P ₀	16.1	24.4	56.9	68.6
P ₄₀	16.9	27.3	59.2	69.6
P ₈₀	19.0	29.2	61.3	72.2
P ₁₆₀	17.9	27.6	61.1	70.1
CD (P=0.05)	1.13	1.6	0.6	0.9
Interaction (VxP)				
CD (P=0.05)	NS*	NS*	S*	S*

(?) جدول 3: ممپلي و پر حاصلاتو او د نايتروجن پر نصب باندې د فاسفورس اغيزې

Treatment	Pods yield (t ha ⁻¹)	kernel yield (t ha ⁻¹)	Haulm yield (t ha ⁻¹)	Biological yield (t ha ⁻¹)	Harvest index (%)	Residual nitro (kg ha ⁻¹)
Varieties Kormaki-V₁						
Paparr-V ₂	1.8	1.3	3.9	5.8	31.7	102.7
SEm±	3.5	2.5	5.9	9.4	36.7	80.6
CD (P=0.05)	0.3	0.27	0.05	0.37	2.3	0.9
	1.1	0.7	0.35	2.4	NS	5.7
Phosphorus doses						
P ₀	2.1	1.4	4.5	6.6	31.4	51.3
P ₄₀	2.6	1.7	4.8	7.4	34.0	83.4
P ₈₀	3.1	2.3	5.3	8.4	36.1	100.5
P ₁₆₀	2.9	2.1	5.1	8.0	35.2	96.3
SEm±	0.17	0.1	0.06	0.18	1.13	1.1
CD (P=0.05)	0.5	0.3	0.03	0.56	NS	3.4
Interaction (VxP) CD (P=0.05)						
	NS*	NS*	NS*	NS*	NS*	S#

مواد او کړنلاره

دغه څيړنه د ۲۰۲۲ کال په پسرلي موسم کې د افغانستان د کرنيزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون په څيړنيز فارم کې په لاره اچول شوې وه. په څيړنه کې دوه ورايتي (کورمکي او پاپري) او څلور مختلفې اندازې د فاسفورس شاملې وې، په مجموعي ډول يې ۸ ترکيبي چلندونه رامنځته کړې ول، د څيړنې په موخه له Spit Plot ډيزاين څخه استفاده شوې وه. پر فاسفورس سربيره ۳۰ کيلو گرامه پر هکتار نايتروجني سره هم د کښت سره سمه استفاده شوې وه. په پای کې د څيړنې د ارقامو د تحليل او تجزيې په موخه له IBM SPSS 24 څخه استفاده شوېده.

پايډي: د څيړنې پايډي څرگندوي چې پاپري ورايتی نسبت کورمکي ورايتی ته د ودې په شاخصونو کې غوره خصوصيات له ځانه ښودلي دي، همدارنگه پاپري ورايتی نسبت کورمکي ورايتی د حاصل د شاخصونو په اساس هم غوره نتيجه ورکړېده، نوموړې شاخصونه عبارت دي له: د پليو شمير پر نبات، په پلي کې د دانو شمير، د ۱۰۰ دانو وزن او د پوښ سلنه. په همدې ترتيب پاپري ورايتی د دانې حاصل، د پروې حاصل، بيولوژيکي حاصل، ناخالص عايد، خالص عايد او د عايد او مصرف ترمنځ نسبت ته په کتو هم پر کورمکي ورايتی بهتره وه. کورمکي ورايتی د ازادي هوا د نايتروجن په نصب کې پر کورمکي ورايتی بهر والی درلوده. د فاسفورس د اندازه له منځه ۶۰ کيلو گرامه پر هکتار نسبت د فاسفورس نورو اندازو ته د ممپليو په وده، د حاصل په شاخصونو، حاصلاتو، ناخالص او خالص عايد باندې د بامو رې مثبت تاثیر درلوده

سپارښتې: د څيړنې د پايلو پر بنسټ سپارښتنه کوو چې د ممپليو څخه د غوره حاصلاتو او عايداتو د لاسته راوړلو په موخه بايد پاپري ورايتی ترويج کړل شي او د ښه حاصل په موخه دې ۶۰ کيلو گرامه پر هکتار فاسفورس استعمال شي.

د افغانستان د کرنيزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څيړنو آمريت



په کندهار کې د روميانو د بازارموندنې اغېزه لرونکې عوامل

لارښود استاد: پوهاند سيد محمد کبير مين

د څېړونکې نوم: پوهنيار سردار محمد هاشمي



پيژندنه

دا څېړنه په کندهار کې د روميانو بازارموندنه څېړي. دا مطالعه به يو داسې چوکاټ (فریمورک) رامنځته کړي، چې په وسيله به ئې کروندګر وکولای سي خپل د روميانو حاصلات په مناسبه بيه وپلوري او هغه ننگوني او ستونزې، چې په دې برخه کې وجود ولري له منځه يوسي.

روميان د باغداری محصولاتو ۱۶ سلنه جوړوي او د سابه جاتو تولېد په ځانګړي ډول د رومي بادنجانو تولېد د کروندګرو په عايد مثبته اغېزه لري او په زياته اندازه د بې وزلي په کمولو کې ونډه لري مګر د بازارموندنې اغېزه لرونکي عواملو ته ئې پاملرنه نه ده شوې. د دې څېړنې تمرکز په کندهار کې د رومي بادنجانو د بازارموندنې اغېزه لرونکي عوامل تر بحث لاندې نيول وه، چې فرعي موخي يې د رومي بادنجانو د بازارموندنې اغېزه لرونکي عوامل تشخيصول او د رومي بادنجانو د بازارموندنې تر ټولو زيات اغېزه لرونکي عامل په ګوته کول وه.



موندني

د متحولينو ضريب

غير معياري ضريب				
معياري خطا	بيټا ضريب	t	د پاملرنې وړ کچه	
12.152	0.354	34.327	.000	(Constant)
0.581	0.066	8.803	.000**	درجه بندي
0.010	0.032	0.3125	0.538	د مارکېټ منځګړي
0.289	0.051	5.666	.000**	چن
0.361	0.055	6.563	.000**	سرې خوني
0.351	0.236	1.487	0.019*	بسته بندي
0.011	0.037	0.292	0.770	مارکېټ معلومات
0.007	0.048	0.151	0.880	تعليم کچه
0.091	0.040	2.270	0.025	بازارموندنې تجربه


تابع متحول: د روميانو بازارموندنه

د پاملرنې وړ کچه: ** 1٪ د پاملرنې وړ، * 5٪ د پاملرنې وړ




میتود او کړنلاره

مفهومي چوکاټ



د ارقامو راټولول او تحليل



پايله

د تابع متحول (د روميانو بازارموندنه) او د متحولينو (درجه بندي، چن، سرې خوني، بسته بندي او د بازار موندنې تجربه په ترتيب سره ۱٪، ۱٪، ۵٪، ۵٪ او ۵٪ په احصائيوي لحاظ د پام وړ وه.

سپارښتنې

۱. پانګوال دي د روميانو له پاره په پروسيس کمپنيانو کې پانګه ونه وکړي
۲. د کرنې وزارت ته دا سپارښتنه کيږي چې د کندهار د روميانو کروندګرو سره د سپرو خونو او نورو د ارزښت علاوه کولو اسانتياوي آماده کړي
۳. کروندګرو ته روزنيز تربيتي تعليماتو فرصتونه برابر کړي.



په وردگو ولايت کې د وطني غواگانو د توليد ارزونه

پوهنيار سيد محمد حامد سادات

پيژندنه: د مالدارۍ سکتور د پرمختګ او ودې په برخه کې خورا يو له مهمو سکتورونو څخه دي کوم چې د هيواد په اقتصادي وده او ثبات کې ډير مهم ارزښت لري. د کرهڼي سکتور د هيواد د خالص توليد ۲۳ سلنه برخه جوړوي چې له دې جملې يې يوازي ۲،۹ سلنه د مالدارۍ له سکتور تقويه کيږي. په هيواد کې د څو لسيزو ناخوالو او وچکالۍ له امله له ۳۰ څخه تر ۴۰ سلنه نفوس د فقر له سخت حالت سره مخ دي چې له جملې يې (۱۶) سلنه کسان عاجلو مرستو ته اړتيا لري (Siddiky, 2015) نو له همدې امله د مالدارۍ سکتور ته خاصه پاملرنه او وده لازمي ده په خاص ډول په ليري پرتو سيمو کې چيري چې خلک د څارويو له روزني خپل ورځني خواړه او ورځني عايد لاسته راوړي (Assadullah et al., 2018). د غواگانو روزنه په هيواد کې د مالدارۍ د سکتور له اړخه د توليد لويه برخه جوړوي چې ورځ تر بلې د پرمختګ په درشل کې ده چه له مخي يې په کال (۱۹۷۶) کې له (۳،۳۲) ميليون څخه په کال (۲۰۱۰) کې و (۴،۷۲) ميليون ته تعداد لوړ شوی چې په ورته وخت کې د کلني توليد کچه يې ۱،۷۲ ټنه ته لوړه شوې ده (Siddiky et al., 2015).

Trait	Significance	
	Overall	
	Mean±SE (n)	
Daily Milk Yield (Kg)	3.213±0.036 (330)	
Lactation Milk Yield (Kg)	874.00±5.450 (330)	
Dry Period (Month)	2.000±0.022 (330)	
Minimum Peak Yield (Kg)	2.872±0.032 (330)	
Maximum Peak Yield (Kg)	4.703±0.034 (330)	
Stage of Lactation (Month)	4.157±0.125 (330)	
Age at first Services (Month)	36.409±0.061 (330)	
Age at first calving (Month)	44.515±0.239 (330)	
Number of service per conception	1.560±0.034 (330)	
Lactation length	296.015±1.055 (330)	
Calving period	2.436±0.062 (330)	
Calving interval	13.419±0.051 (330)	


جدول ۱. په وطني غواگانو د productive and reproductive performance اوسط توليد ښودنه کوي.

مواد او کړنلاره: د موضوع پيژندنې او اهميت ته لنډه کتنه، د ستونزې بيانول او موخه په افغانستان کې د وطني غواگانو د توليد او نسل په اړوند کومه څيړنه نه ده ترسره شوې. له همدې امله، د يادو څارويو د شيدو د ورځني توليد، د شيدو په توليدي دوره کې د توليد اندازه، د توليد په جريان کې د زيات توليد اندازه، د وچوالي دوره، د لومړي بلوغت دوره، د بچي د توليد موده، د حاملگي دوره او توليد نسبت څيړل شوي دي. ياده څيړنه د وطني غواگانو د روزنکو سره د مخامخ جر بحث په نتيجه کې تر سره شوي او اړونده معلومات راټول شوي دي. د څيړني اړونده ډاټا د (SPSS) سيستم له لاري تحليل او تجزيه او پايلې يې په اړونده جدول کې واضح شوي دي.

پايله او سپارښتنې:

د څيړنې پايلې داسيې چې د وطني غواگانو نسل د هيواد په وچو او غرنیو سيمو کې د ښه توليد وړتيا لري چې په ورځني ډول د شيدو توليد يې (3.213 ± 0.036) کيلو، د شيدو د کلني توليد اندازه يې (874.00 ± 5.450) کيلو، د وچوالي مناسبه دوره يې (2.000 ± 0.022) مياشتي، د شيدو د توليد په يوه دوره کې تر ټولو لوړ توليد يې (4.703 ± 0.034) کيلو، د شيدو د توليد ټوله موده يې (4.157 ± 0.125) مياشتي د نر غوښتنې لومړي دوره يې (36.409 ± 0.061) مياشتي، د لومړي لنگون نيټه يې (44.515 ± 0.239) مياشتي د شيدو د توليد ټوله کلني موده يې (296.015 ± 1.055) ورځي ده د حاملگي دوره يې (2.436 ± 0.062) مياشتي او د دوه لنگونو ترمنځ اوسط موده يې (13.419 ± 0.051) مياشتي ده. څيړني موندلې چې د وطني غواگانو نسل د په غرنیو، وچو ساحو کې چې د کښت او کروندې لپاره د بزگرانو توليدي منابع کم وي د ورځني عايد يو ښه سرچينه او د غذايي خونديتوب په بهرینه منبع ده.

مقدمه: گندم یکی از اعضای مهم فامیل گندمیان (*Poaceae*) و عضو بسیار مهم غله جات در سطح جهان بوده و ۲۰٪ از انرژی مورد نیاز کتله بزرگ نفوس جهان را بر آورده میسازد. هیومیک اسید بخشی از هیومس در مواد عضوی خاک است که توسط تجزیه فیزیکی، کیمیاوی و میکروبیولوژیکی بایومالیکول ها تولید میشود. تولید گندم در جهان اکنون ۶۴۲ میلیون تن میباشد و پیش بینی میشود که تقاضای گندم در سال ۲۰۵۰ به ۸۴۰ میلیون تن افزایش یابد. از طرفی نفوس در کشورهای که از گندم منحصی غذای اصلی تغذیه میکنند به سرعت رو به افزایش است، لذا، اکنون تولیدات گندم تقاضای نفوس روز افزون جهان را برطرف نمی تواند. طبق گزارشات، استفاده از هیومیک اسید نه تنها باعث انکشاف نموی نباتات شده، بلکه استفاده همزمان از هیومیک اسید و کود های کیمیاوی مصارف کود کیمیاوی را ۵۰٪ کاهش میدهد. اثرات هیومیک اسید بر رشد گندم قبلا مورد بررسی قرار گرفته است، اما انکشاف نموی گندم با استعمال همزمان هیومیک اسید و کود کیمیاوی نیاز به تحقیقات گسترده تری را تقاضا مینماید. لذا تحقیق حاضر به هدف مطالعه اثرات همزمان کود کیمیاوی و هیومیک اسید بر انکشاف نموی گندم در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در قندهار صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده همزمان از کود کیمیاوی و هیومیک اسید ارتفاع گندم، وزن تازه نبات، طول ریشه و وزن تازه ریشه را به صورت معنی دار به ترتیب ۶،۰۹٪، ۲۳،۴۰٪، ۳۷،۵۰٪ و ۳۰،۳۰٪ افزایش داد.



شکل (1): الف: ارتفاع نبات (سانتی متر)، ب: وزن تازه نبات (گرام)، ج: طول ریشه (سانتی متر)، د: وزن تازه ریشه (گرام). اعداد اوسط $\pm$ SD سه تکرار (n=12) است. LSD برای مقایسه اوسط ها صورت گرفته است.

مواد و روش تحقیق: این تحقیق در ناحیه هشتم شهر قندهار در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ صورت گرفته است. معادل مقدار ۱۰۰ کیلو گرام در هکتار بذر وراثتی چونت گندم در گلدان هایی که دارای خاک مزرعه بود کاشته و در طرح Completely Randomized Design (CRD) با ۴ تریتمنت و ۳ تکرار جابجا گردید. چهار تریتمنت شامل در تحقیق به ترتیب عبارت بود از T0 (کنترل)، T1 (کود کیمیاوی، یوریا و DAP)، T2 (هیومیک اسید) و T3 (هیومیک اسید و کود کیمیاوی). کودهای یوریا و DAP طبق دستور محلی استعمال و شکل گرانول هیومیک اسید با عمق ۵ سانتی متری خاک قبل از کاشت مخلوط گردید. در جریان تحقیق تمام عملیات آگرانومیکی محلی مانند آبیاری، کنترل آفات، امراض و علف های هرز به صورت منظم صورت گرفت.

نتیجه گیری و سفارشات: ارتفاع نبات گندم توسط تریتمنت های T1، T2 و T3 به ترتیب ۱۲،۱۵٪، ۶،۰۹٪ و ۲۰،۱۰٪ افزایش یافت، همچنان وزن تازه نبات توسط تریتمنت های T1، T2 و T3 ۱۵،۲۵٪، ۱۳،۰۴٪ و ۲۴،۸۱٪ افزایش معنی دار را نشان داد. بر علاوه طول ریشه نبات گندم در تریتمنت های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب ۳۱،۷۹٪، ۳۷،۵۰٪ و ۲۸،۵۷٪ افزایش یافت. وزن تازه ریشه نیز در تریتمنت های T1، T2 و T3 به ترتیب ۳۳،۳۳٪، ۳۰،۳۰٪ و ۶۳،۴۹٪ افزایش معنی دار یافت. لذا استعمال همزمان کود کیمیاوی و هیومیک اسید نه تنها نموی گندم را انکشاف میدهد، بلکه مقدار و مصارف کود کیمیاوی را کاهش میدهد. تحقیقات آینده اگر در شرایط حقیقی مزرعه صورت گیرد و مقدار دقیق هیومیک اسید مشخص گردد مفید خواهد بود.



د سپینې لوبیا په وده او حاصل باندې د نایتروجن او فاسفورس سرو د بیلا بیلو اندازو اغیزی

څیړونکي: یوهنبار وکیل احمد سیرت


پېژندنه

تور سترگی سپینه لوبیا (*Vigna Unguiculata* L.) چې زیاتره خلک یې د سپینې لوبیا په نامه سره یادوي او په انګلیسي کې ورته Black-eyed bean وایي، د لیګوم کورني پورې اړه لري، چې د زیاتو مقصدونو لپاره لکه انسانانو ته د غذا، څارویو ته د علوفې او د هوا د آزاد نایتروجن نصب کونکي په توګه استعمالیږي. له مېلو او ماشو څخه وروسته دریم مهم نبات دی. د وچکالۍ او گرمۍ هوا په وړاندې مقاوم دي، د هیواد په گرمو او وچو سیمو کرل کیږي، د افغانستان په څیر په وروسته پاتې هیوادونو کې د پروتین خوارځواکۍ یوه جدې ستونزه ده. په غذایی رژیمونو کې د حبوباتو استعمال کولای شې د خوارځواکۍ بحران په له منځه وړلو کې مرسته وکړي، د یاد نبات پلې د فایبر، منرالونو، کلسیم او ویتامینونو په ځانګړې توګه د ویتامین A او C له سرچینو څخه غني دی. دانی، پانی او نازکې ساقې یې د زیات غذایی ارزښت درلودونکې دي چې د وچ وزن په اساس د خام پروتین اندازه یې له 20-30 سلنه په دانه او پانه کې شتون لري. نایتروجن او فاسفورس د نبات د ودې او حاصل زیاتوالي لپاره یو له مهمو او ضروري عناصرو څخه شمیرل کیږي. له همدې امله مو یاده څېړنه په کندهار ولایت کې د سپینې لوبیا په وده او حاصل باندې د نایتروجن او فاسفورس د بیلا بیلو اندازو د استعمال اغیزی او مناسب دوز موندلو په موخه تر سره کړې ده.


جدول ۱: د سپینې لوبیا په وده باندې د N او P د مختلفو اندازو اغیزی

Treatments	Plant height (cm)			Leaves/Plant			Dry matter accumulation (g)		
	30 DAS	60 DAS	harvest	30 DAS	60 DAS	90 DAS	30 DAS	60 DAS	105 DAS
Nitrogen Levels (kg/ha)									
N ₀ : 0	3.71	20.36	39.65	3.72	32.17	49.7	0.33	9.03	34.70
N ₁ : 20	3.85	21.54	42.26	3.67	33.25	53.0	0.35	9.58	36.91
N ₂ : 30	3.98	21.93	43.65	4.28	35.92	54.9	0.41	10.72	39.20
N ₃ : 40	3.92	21.63	42.57	4.00	34.53	57.1	0.33	9.54	38.72
SE _{me}	0.028	0.13	0.25	0.05	0.29	0.45	0.004	0.068	0.33
LSD (P=0.05)	0.081	0.38	0.72	0.13	0.85	1.30	0.011	0.196	0.95
Phosphorus Levels (kg/ha)									
P ₀ : 0	3.75	20.65	40.51	3.89	31.20	52.0	0.34	9.22	35.76
P ₁ : 30	3.87	21.21	42.23	3.70	34.61	54.8	0.38	9.66	37.89
P ₂ : 60	3.96	21.85	43.40	4.03	35.61	55.7	0.35	10.06	39.08
P ₃ : 90	3.88	21.58	41.98	4.06	33.20	52.3	0.34	9.92	36.79
SE _{me}	0.069	0.32	0.61	0.11	0.72	1.10	0.010	0.166	0.81
LSD (P=0.05)	0.199	0.95	1.74	0.33	2.10	3.18	0.028	0.481	2.34
Interaction (N x P)									
S. Em _{st}	0.097	0.46	0.86	0.16	1.02	1.56	0.014	0.24	1.15
LSD (P=0.05)	0.282	1.34	2.48	0.46	2.93	4.50	0.040	NS	3.31


گراف ۱: د سپینې لوبیا په حاصلاتو باندې د N او P د مختلفو اندازو اغیزی



تصویر ۲: د فاسفورس مناسبې اندازې موندل



تصویر ۱: د نایتروجن مناسبې اندازې موندل



مواد او کړنلاره: یاده څېړنه په 2021 میلادي کال د پسرلي موسم د ثور میاشت کې د اناسټو پوهنتون په څېړنیز فارم کې تر سره شوی، تر څو د سپینې لوبیا پر وده او حاصل باندې د نایتروجن او فاسفورس د مختلفو اندازو اغیزی معلومی او تر څنګ یې د عناصرو مناسب اقتصادي دوز وموندل شي. نوموړې څېړنه په RCBD ډیزاین او درېو تکرارونو کې تر سره شوې. په دې څېړنه کې ټول (16) تریتمینټونه چې څلور د نایتروجن مختلفې اندازې په ترتیب سره (N_0, N_{20}, N_{30} and N_{40} kg/ha) او څلور د فاسفورس مختلفې اندازې په ترتیب سره (P_0, P_{30}, P_{60} and P_{90} kg/ha) سره ښودل شوې. د نایتروجن سره د یوریا او فاسفورس سره د Triple Super Phosphate له سرچینو څخه نبات ته ورکړل شویده، چې ټوله فاسفورس او پوتاشیم د تریتمینټونو د اندازې مطابق د کرلو په وخت کې او نایتروجن بیا نبات ته د تریتمینټونو مطابق په درېو وختونو کې ورکړل شوي دي.

پایله او سپارښتنې: پایلو وښودله چې 30 kg نایتروجن او 60 kg فاسفورس د مختلفو اندازو استعمال د نبات په جګوالۍ، د پاڼو په شمیر او وچو موادو په وزن باندې د پام وړ اغیزه درلوده. د 30 kg نایتروجن او 60 kg فاسفورس په استعمال سره یې د نورو تریتمینټونو په پرتله د نبات په جګوالۍ او وچو موادو په تولید باندې په ټولو وده ایزو مرحلو کې د پام وړ زیاتوالی درلود او تر څنګ یې تر ټولو زیات د دانی حاصل (2881) او پروپ حاصل (5078) د 30 kg N/ha او (2891) او (5110) د 60 kg P/ha کې تر لاسه شوی دی. همدارنګه د نایتروجن او فاسفورس د مختلفو اندازو په کارولو سره د نایتروجن مناسب اقتصادي دوز 36.8 kg ha^{-1} او د فاسفورس مناسب اقتصادي دوز 50.7 kg ha^{-1} لاسته راغلي وو. چې د کندهار ولایت اناسټو په څېړنیز فارم ریګي لوم خاوره کې 30 kg ha^{-1} نایتروجن او 60 kg ha^{-1} فاسفورس ګډ استعمال د سپینې لوبیا د وده او حاصلاتو په زیاتوالي باندې synergistic مثبت اغیزه درلوده.

د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څېړنو آمریت




د وربشو پر تولید او عایداتو باندې د هرزه وانبو کنترول او نایتروجن د استعمال اغېزې

څېړونکی: پوهنېار کرامت الله فاضل


پېژندنه

وربشې په ملي او نړیواله کچه د غنمو، وریجو او جوارو څخه وروسته د غله جاتو کورنۍ څلورم مقام لري. چې د غوره کیفیت درلودلو له امله په حیواني او انساني غذا کې ورڅخه استفاده کیږي. وربشې د مختلفو نابرابره شرایطو او په خاصه توګه په لوړې پي ایچ خاورو کې هم ښه مقاومت کوي او زیاتره وختونه یې په بازار کې قیمت د غنمو سره معادل او یا لوړ وي، نو په همدې اساس په نابرابره شرایطو کې د غنمو یو ښه بدیل او د عایداتو لاسته راوړنې یو ښه نبات ګڼل کیږي. ددې نبات حاصلات په افغانستان کې د نړۍ په نسبت ډیر لږ دي او مختلف عوامل کیدای شي ورباندې اغېزې ولري. هرزه وانبه په لویه کچه حاصلات زیانمنوي او ورسره د ښې وده او حاصل لپاره د سرو مدیریت او د عناصرو رسول ډیر اړین او مهم دي، دا چې دا برخه په هیواد کې ډیره لږه څیړل شوې ده نو ځکه مو وغوښتل چې اغېزې یې به کندهار ولایت کې وڅیړو.


موندنې



د حاصل برخې



د وربشو حاصل



د وربشو اقتصادي برخې

مواد او کړنلاره

یاده څېړنه د اناسټو په څېړنیز فارم کې د ۲۰۱۹-۲۰۲۰ میلادي کلونو په جریان کې ترسره شوله. د تجربوي ساحې خاوره Sandy loam او د ۷.۱۳ پي ایچ درلودونکې وه. څېړنه په Split Plot Design او دریو تکرارونو کې ترسره شوه چې اصلي او فرعي ترتیمینټونه یې په لاندې ډول وو:

الف: اصلي پلاټونه (د هرزه وانبو کنترول) ب: فرعي پلاټونه (د نایتروجن اندازې)

W₁: غیر کنترول شوي هرزه وانبه **N₀**: کنترول (0 kg N / ha)

W₂: سپارښت شوی ډوز د Clodinofof + Metsulforon **N₄₀**: (40 kg N / ha)

W₃: د کرلو تر مخه د ځمکې قله + 2.5 t/ha د غنمو پروپه + نیمایي ډوز هریسایډ **N₈₀**: (80 kg N / ha)

N₁₂₀: (120 kg N / ha)

پایله او سپارښتنې

د هرزه وانبو هر اړخیزه کنترول، چیرته چې د کښت څخه ۱۵ ورځې تر مخه ځمکه قله شوې وه او په تعقیب یې د کرلو څخه وروسته ۲.۵ ټنه پر هکتار پروپ او بیا په ټانکۍ کې ګلډ کرل شوی د Clodinofof+metsulforon نیمایي ډوز د کرلو څخه ۳۰ ورځې وروسته استعمال د وربشو حاصلات او عایدات د اهمیت وړ توګه لوړ کړي وو. د نایتروجن ۱۲۰ کیلوګرام پر هکتار او په ډیر نږدې تعقیب سره یې ۸۰ کیلو ګرام پر هکتار د وربشو په حاصلاتو او عایداتو کې د پام وړ زیاتوالی راوستلی وو.

همدې پایلې ته په کتو سره د هرزه وانبو کنترول هر اړخیزه طریقه او د نایتروجن ۸۰ کیلوګرام پر هکتار سپارښتنه کیږي.

د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څېړنو آمریت



د میلو کمپنی مشتریان رضایت باندې د تولیداتو کیفیت ټاکونکو عواملو اغیزې

لارښود استاد: پوهنیار عزیز الرحمن رگبتي

څیړونکی: سمیع الله سیال

پېژندنه

د ښه کیفیت تولیدات د یو تجارتي سازمان د تداوم لپاره مهم اصل دی. د تولیداتو کیفیت د کیفیت ټاکونکو عواملو په اساس معلومېږي چې ځینې یې عبارت دي له د محصول سایز، د محصول شکل، د محصول اعتبار، د محصول دوام، د محصول ذایقه، محصول ته لاس رسی، د محصول قیمت، اعتبار، خواخوږي او نور. کیفیت عبارت د هغه عامل څخه دی چې ښه والی یې د مشتریانو د رضایت او خوشحالی لامل کیږي. میلو کمپنی لمړي ځل په ۲۰۰۷م کال کې په کندهار ولایت عینو مېنه کې د (۳۵۰۰۰) پنځه دیرش زره ډالرو په پانګونې سره په فعالیت پیل کړی دی. نوموړی کمپنی ۲۰۲۰ کال کی رسمي جواز ترلاسه کړ، د میلو د تولیداتو څانګې په لومړیو کې (۱۳) څانګې وې چې اوس مهال په (۲۰۲۳) م کال کی د څانګو شمیر ۲۶ ته رسیدلی. میلو کمپنی د شیدو راټولو لپاره کندهار کی ۷ عدده MCC لري، د پیروندونکي رضایت د ترلاسه شوي خدماتو یا محصولاتو پرتله کولو وروسته د پیروندونکي رضایت کچه ده،

ستونزې بیان

اکثره شرکتونه په دې نه پوهیږي چې د کوم علت په اساس خپل مشتریان دلایسه ورکوي، له بل طرفه د میلو کمپنی مشتریان رضایت کچه معلومه نده. دهمدغې ستونزې په کتو سره یاده څیړنه ترسره شوې.

د څیړنې اهمیت

ددې څیړنې څخه به د میلو کمپنی د تولیداتو د کیفیت او مشتریانو د رضایت په برخه کې د معلوماتو په چمتوولو کې استفاده وکړي ترڅوداسې پرېکړې وکړي چې د تولیداتو کیفیت په ښوالي او د مشتریانو رضایت ترلاسه کړي. د میلو کمپنی به وکولای شي چې له نوموړې څیړنې څخه د بازار موندنې په برخه کې استفاده وکړي.

میتودولوژي

نوموړې څیړنه په کندهار ښار کې د میلو کمپنی په ۲۶ څانګو کې سرته رسیدلې ده. په نوموړې څیړنه کې دوه ډوله ارقامو څخه استفاده شوې ده لومړني معلومات د پوښتنیایي په واسطه راټول شوي اودوهي معلومات د کتابونو، مقالو، انټرنیټي ویب ساینونو څخه، د نموني اندازه د (Yamane, 1967:886) لخوا د وړاندې سوي فورمولي په اساس محاسبه کړو $n = N / 1 + N(e)^2$ ، اطمینان ضریب مو ۹۵٪ سلنه او د توقعي غلطی مقدار مو (۰،۰۵) د پوښتنیایي شمیر مو ۳۸۶ دی، د فرصتي نمونه اخستني (Opportunity Sample) میتود څخه استفاده شوې ده، دغه میتود د (Convenience Sampling) په نوم هم یادیږي. راټوله شوې ډاټا د اکسل پروګرام پواسطه تحلیل او ارزیابي شوې ده.

پایله

موندنې

د څیړنې په نتیجه کې ویلی شو چې د میلو کمپنی خپلو مشتریانو لپاره یې ډیر تولیدات او خدمات وړاندې کړي دي چې په اساس یې د ۸۰ سلنه څخه زیات د مشتریانو رضایت ترلاسه کړی دی. د تولیداتو کیفیت یې تر ډیرې اندازې خوشوي، د تولیداتو بسته بندی یې ډیره ښه ده، د میلو کمپنی نرخونه د اوسني اقتصادي حالت سره یو څه برابر او مناسب دي او د خلکو ضرورت یې تر ډیره حده رفع کړی دی نو په نتیجه کې ویلی شو چې د میلو کمپنی څخه مشتریان ډیر زیات راضي دي.

میلو کمپنی ته وړاندیزونه

میلو کمپنی باید خپل د تولیداتو کیفیت پر نړیوال معیار برابر کړي. خپلو تولیداتو ترڅنګ خدماتو ته پراختیا ورکړي. میلو کمپنی باید د تولیداتو نرخونه د اقتصادي وضعیت سره سم و ټاکي.

منځنۍ

میلو کمپنی تولیداتو نرخونه څنګه ارزوي؟

شمار	group	frequency	percentage
۱	ډیر لوړ	88	23
۲	لوړ	98	25
۳	مناسب	158	41
۴	ښکته	42	11
مجموعه	۴	386	100

د خپل قدرمن لارښود استاد پوهنیار عزیز الرحمن رگبتي څخه ډیره زیاته مننه کوم چی د دومره زیات مصروفیت سره یې بیا هم زما سره د څیړنیزې پروژې په ترتیب کولو کې زیات زیار او زحمت کښلی، هیله ده وي د څلورکلنې دورې محترمو استادانو څخه نړۍ مننه کوم چې زموږ په زده کړه کې یې نه ستړی کیدونکي هلې ځلې کړي رب مو ښاد او اباد لره.

د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژي ملی پوهنتون، د علمی څیړنو آمریت



د کندهار ولایت د شیدو غواگانو فارمونو په تولید باندې د روزنې مدیریت

اغیزې



لارښود استاد: پوهنمل نعیم جان عادل

څیړونکی: احسان الله امین

پېژندنه

د هیواد دنورو سیمو په څېر د کندهار په ولایت کې هم د شیدو د تولید په موخه مالداران او فارمداران د شیدو غواگانو مختلف نسلونه روزي، په یاد ولایت کې د شیدو غواگانو زیات تجارتی فارمونه شتون لري یاد فارمونه نشي کولای ترڅو زموږ د هېوادوالو د شیدو او نورو کبفیت لرونکو لېني محصولاتو اړتیا پوره کړي، که څه هم تازه شیدې او نور لېني محصولات په یاد ولایت کې په پراخه پیمانه تولیدیږي خو د یو غیر منظم روزني مدیریت او د منظم بازارموندنې سیستم د نشتوالي په صورت کې محصولات په ټیټ اوکمه بیه پلورل کېږي، یاده څېړنه ځکه د ارزښت وړ ده چې د شیدو غواگانو فارمونو په تولید باندې د ښه، متوسط او ضعیف مدیریت ترمنځ پرتله کول فارمدارانو ته په گوته شوی فارمداران به وکولای شي خپل تولیدات په لوړه بیه بازار ته وړاندې کړي، د شیدو غواگانو فارمداران د ښه روزنې د مدیریت په لارو چارو پوهول او تشویق کول، فارمونه د مدیریت له پلوه جلا او اړوند خلکو سره د څېړنې پایلې شریکول، په سیمه کې د شیدو غواگانو فارمونو صنعت ته وده ورکول دي یاده څېړنه د ځینو ستونزو له امله ترسره شو چې په کندهار ولایت کې په پوره کچه د شیدو غواگانو د روزنې فارمونه شتون لري ولې د مصرف کوونکو اړتیاوې نشي پوره کولای د شیدو غواگانو فارم لرونکي د فارمونو څخه کم عاید ترلاسه کول، د ناسم مدیریت شتون چې په تولید باندې منفي اغیزه لري په یاد ولایت کې د شیدو ورکونکو غواگانو په فارمونو کې د مسلکي او فني اشخاصو کموال مهمې ستونزې بلل شوی، ددې څېړنې څخه مو موخه په کندهار ولایت کې د شیدو غواگانو د فارمونو د روزنې مدیریت ارزونه، د شیدو غواگانو د فارمونو په تولید باندې د ښه، متوسط او ضعیف مدیریت ترمنځ د اغیزو پرتله او په فارمونو کې د تولید اندازه، لگښت او عاید څېړل وه.

موندنې



مواد او کړنلاره

دغه څېړنه دتوصیفی (Descriptive) څېړنې دمیتود څخه په استفادې دپوښتنپانې دمیتود پواسطه پرمخ وړل شوی ده چې د کندهار ولایت په مرکز، ډنډ او ارغنداب ولسوالیو په (۴۰) باب د شیدو تولیدونکو غواگانو فارمونو کې ترسره شوي پدې څېړنه کې دمعلوماتو د راټولولو لپاره له مختلفو لارو څخه گټه اخستل شوې چې د څېړنې د موخو د لاسته راوړلو لپاره د لمړني ارقامو (Primary Data) او دویمي ارقامو (Secondary Data) څخه گټه اخستل شوې ده، دویمي معلومات د بهرنیو معتبرو ژورنالوو، مقالو، علمي کتابونو او ویب پاڼو څخه مو ترلاسه کړې ده. لمړني معلومات یا (Primary Data) د شیدو تولیدونکو غواگانو فارمونو څخه راټول شوي دي. د څېړنې د ښه تطبیق لپاره دڅېړنې په ساحه کې په تصادفي ډول ساحې یا کلي وټاکل او له ځوابولو څخه وروسته مو معلومات ترې را جمع او راټول شوي معلومات د MS Excel پواسطه تجزیه او تحلیل شوي دي.

پایله

د څېړنې پایلو وښوده چې په هر فارم کې دوطنیو غواگانو په نسبت زراعتي غواگاني ډیرې روزل کیدې ځکه دشیدو لپاره زراعتي غواگاني نسبت وطني غواگانو ته زیات تولید درلوده، د یوې وطني غوا د شیدو تولید اندازه په اوسط ډول (۱۵ لیتر/ورځ)، د کورنۍ په سطحه د شیدو د مصرف اندازه (۲ لیتر/ورځ)، د کورنۍ د مصرف څخه اضافي د شیدو تولید (۱۳ لیتر/ورځ)، د شیدو مصرف اندازه (۱ افغانی/لیتر) په یوه ورځ کې لگښت یې درلوده. د یوې زراعتي غوا د شیدو تولید اندازه په اوسط ډول (۳۶ لیتر/ورځ)، د شیدو مصرف اندازه یې په اوسط ډول (۴ افغانی/لیتر) په یوه ورځ کې لگښت درلوده، د شیدو د خرڅلاو بیه (۲۷ افغانی/لیتر) وه. دوی ټولي تولید شوې شیدې کوپراتیفونو ته ورکولې دې څېړنو ښايي چې تجارتی فارمونو د شیدو تولید نسبت کوپراتیفي مالدارانو ته څو چنده زیات دي او زیاته گټه لاسته راوړي. ۹۵٪ سلنه فارمونو کې د طبیعي القاح له میتود څخه او ۵٪ د مصنوعي القاح له میتود څخه استفاده کوله. ۶۰٪ سلنه فارمدارانو په فارم کې کوم مخصوص وترنر ډاکتر نه درلود خو د ضرورت په وخت کې به یې راغوښته او ۴۰٪ سلنه فارمونو کې کوم مسلکي وترنر ډاکتر نه درلود ځکه چې پخپله مسلکي ول.

منتلیک

دا چې خپله څېړنیزه موضوع مي خپل قدردن لارښود استاد پوهنمل نعیم جان عادل تر لارښوونې لاندې ولیکه ور څخه ډیره مننه کوم چې زما د څېړنیزې پروژې په ترتیب کې یې زیات زیار راسره کښلی او دالله تعالی په ملتیا د نورو استادانو په لارښوونو او د ملگرو په مرسته د دغه اثر په ترتیبولو بریالی شوم او له خپلې درنې کورنۍ څخه چې تل یې زموږ سره د علم او پوهې په لاسته راوړلو کې له هېڅ ډول هڅو او مرستو څخه ډډه نده کړې او خپل بریالیتوب د دوی د لارښوونو او حوصله مندی پایله بولم.





پر عرضه او تقاضا باندې د نفوسو د زیاتوالي اغیزې


لارښود استاد: جمعه گل (صدیقی)

څېړونکی: رفیع الله (امیری)


پېژندنه: لکه څرنگه چې نړۍ د طرقی خواته روانه ده؛ نو موږ په دې باندې پوهېږو، چې نړۍ د نفوس هم مخ پر زیاتیدو دی، اوس مهال د نړۍ نفوس ۸۰۴۵۳۱۱۴۴۷ دی چې د اشمیرنه مخ پر ډیرېدو ده، چې په هره ثانیه کې ۴ نفره نوي د نیا ته راځي. هغه عوامل چې عرضي او تقاضا د زیاتوالي سبب ګرځي نوي ټکنالوژۍ، ښه اقلیمي شرایط، د نفوسو زیاتوالی، جنس د نرخ ټیټوالی. د نفوسو مخنیوي مناسبې لارې اوده اړتیا په وخت کې ترې د اړوند اورګانونو استفاده کېږي. د اچي مخ پر ودې هېوادونو کې دوامداره ناامني د جګړو او فساد زیاتوالې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی یوځل دی، چې نوموړی ستونزه پر عرضه او تقاضا باندې منفي تاثیرات لري او دا یوه لویه ستونزه بلل کېږي. پر عرضه او تقاضا باندې د نفوسو د زیاتوالي اغیزو باندې پوهېدل. د نفوسو د زیاتوالي لاملونه پېژندل. پر عرضه او تقاضا باندې د نفوسو زیاتوالی منفي اغیزې بیانول.

موندنې


ایا د نفوس په زیاتوالي سره به د خوراکي توکو په قیمتونو کې تغیرات راشي؟



د نفوس د زیاتوالي لاملونه کوم دي؟



په کومو هېوادونو باندې د نفوس زیاتوالی زیات تاثیر لري؟



مواد او کړنلاره :

لومړني معلومات: د موضوع دڅېړلو لپاره دکندهار، غزني، کابل، ولایتونو د سلو په شاوخوا کې خلکوڅخه د پوښتنې په ذریعه معلومات راټول شوي، چې کندهار کې ۳۰ نفر، کابل کې ۴۰ نفر او غزني کې ۳۰ نفروته دغه پوښتنلیکونه توضیح شوي دي. او د (EXCEL) پروگرام په واسطه تحلیل او گراف بندي شوي، چې د موضوع اړوند پوښتنو ته په کې ځواب پیدا او واضح شوي دي. دوهمي معلومات: د مختلفو داخلي او خارجي معتبرو کتابونو انټرنټي سایټونو څخه استفاده شوې ده.

پایله او سپارښتنې: د نفوسو زیاتوالی په عرضه او تقاضا باندې مستقیمې او غیرمستقیمې اغیزې لري. یعنې د نفوسو په زیاتوالي سره عرضه او تقاضا هم زیاتېږي، هم کمېږي. د نفوسو په زیاتوالي کومې کورنۍ، خلک، چې مخکني دندې سره یې کم عواید درلود اوس هغه عواید هغوی ته کفایت نه کوي؛ نو دوی مجبوره دي چې کوشنې وکړي بله وظیفه ترلاسه کړي، چې په دې سره دکار دندې ته تقاضا زیاتېږي او دندې عرضه کمېږي چې په نتیجه کې بېکاري رامنځته کېږي ښه مثال یی ورسته پاتې هیوادونه دي. د خلکو لپاره عامه پوهاوي ترڅو نفوس کنټرول شي، او د افغانستان زراعتي سکتورونو ته خاصه توجه وشي، ترڅو د خلکو تقاضا پوره شي.

منتلیک: د خپلو والدینو (مور او پلار) او وروڼوڅخه ډیره مننه کوم چې راسره یې نه هېرېدونکي هلې ځلې کړي دي، اوموږ یې د خپلو درسونو ته هڅولي یو، په دوهم قدم کې زما گران ورور ډاکتر صاحب نورالله څخه مننه کوم چې زما سره ډېر هلې ځلې کړي دي، او هم د دروند ریس صاحب او قدرمنو استادانوڅخه اود قدرمن لارښود استاد څخه ډیره مننه کوم، چې له ماسره د موضوع په ترتیب کولو کې نه سترې کېدونکي هلې ځلې کړي دي.

د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون، د علمی څېړنو آمریت



په افغانستان کې د پيازو د بسته بندي لارې او اقتصادي ارزښت

لارښود استاد: جمعه گل (صديقي)


څيړونکي: سيد اکبر (سیرت)

پېژندنه


افغانستان د مختلفو اقليمونو درلودونکی دي، چې په همدې اساس د زياتو سبزيجاتو او مېوه جاتو اصلي ټاټوبي ښودل شوې دي دا چې پياز زموږ د هيواد د مهمو زراعتي محصولاتو څخه شميرل کيږي، اود هيواد اقليمي شرايطو ته په کتلوسره ښه وده کولای شي، ددی ترڅنگ زيات اقتصادي او غذايي ارزښت هم لري، او هم د هيواد يو مهم صادراتي محصول شميرل کيږي، ددې څيړني په ترسره کولو سره به موږ وکولای شو چې د پيازو د بسته بندي نوي او عصري لارې چارې او د پيازو اقتصادي ارزښت څرگند کړو، د پيازو بسته بندي، په نوي اومعيارې شکل، په مناسب وخت کې بسته بندي کول، لېل وهل، اوله ژرخرابېدو څخه مخنيوی، اوپه مناسب وخت کې مارکيټ ته عرضه کول، ترڅو د پيازو اقتصادي ارزښت زيات او کروندگرو ته ښه او لوړ عايد لاسته راشي، څرنگه چې په افغانستان کې هرکال په زياته اندازه پياز کرل کيږي، او په زياته اندازه حاصل ورڅخه لاسته راځي، مگرهغه وخت چې د پيازو حاصل ورسپري، په هغه وخت کې د پيازو نرخونه ډير ټيټ وي حتا په ځينوځايونو خپل مصارف بيرته نشي پوره کولای او کروند گريزانمن کيږي، په افغانستان کې د پيازو د بسته بندي نوي او عصري لارې او اقتصادي ارزښت څرگندول، په افغانستان کې د پيازو بسته بندي پر وړاندې خنډونه او د بازارموند ني نشتون واضح کول، په افغانستان کېد پيازو بسته بندي دود يزي لاری چاري معلومول.

موندنې


د پيازو بسته بندي د پيازود خرابېدو په کمښت باندې څومره اغيزه لري ؟



بسته بندي د پيازو په نرخونو او خرڅلاو باندې څومره اغيزه کوي؟



د افغانستان په کوم ولايتونو کې د پيازو بسته بندي په زياته اندازه سره ترسره کيږي ؟



مواد او کړنلاره

نوموړې څيړنه ساحوي بڼه لري او د دوه ډوله معلوماتو څخه گټه اخيستل کيږي. اول لومړنې معلومات (primary data) دپوښتنلیک څخه په استفادې سره یی لومړنې معلومات راټول کړل اود (50) په شاوخوا کې پوښتنلیکونه د هيواد درې ولايتونو لکه کندهار (20) هلمند (10) او غزني (20) داني پوښتنلیکونه د هدف لاندې خلگو ته توزیع کړل لکه: بزگران، د پيازو کارکونکي، د مارکيټ مسوولين اوداسي نور... تر راټولولو وروسته د (Excel) پروگرام، پر مټ تحليل او تجزيه شوي دي او د ارايې لپاره آ ماده شوي دي. دوهمې معلومات (Secondary data) د مختلفو داخلي او خارجي معتبرو کتابونو، علمي مقالو کړنيزو مجلو او انټرنیټي سايتونو څخه استفاده شويده .

پايله

ددې څيړني په ترسره کولو سره داسي پایله لاسته راځي چې که په افغانستان کې د پيازو بسته بندي په معياري او عصري شکل سره ترسره شي د پيازو د خرابېدو په کمښت کې به پنځوس فيصده رول ادا کړي او کروندگر به د زيات عايد د لاسته راوړلو څخه برخمن شي. وړاندیز: مواد د افغانستان حکومت څخه چې دزراعتي محصولاتو له توليد څخه وروسته مېوه جاتو اوسبزيجاتوته زياته پاملرنه وکړي.

منتليک

تر هر څه وړاندې د ستر کاياناتو څښتن د انسانانو خالق او پيدا کوونکې شکر اداء کوم دوهم دخپلو والدينو (مور او پلار) او ورونو څخه ډيره مننه کوم چې راسره يې نه هيرېدونکي هلي ځلي کړي او موږ يې د خپلو درسونو ته هڅولي يو، په دريم قدم کې د دروند رئيس صاحب او قد رمنو استادانو بيل خصوص د قدرمن لارښود استاد څخه ډيره مننه کوم چې له ما سره يې د موضوع په ترتيب کولو کې مرسته کړې ده، د زړه له تله مننه ځنی کوم .

د افغانستان د کړنيزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څيړنو آمريت



د څيرې پر وده باندې د کرلو طريقو او نايټروجن د مختلفو اندازو اغيزې

لاړښود استاد: پوهنيار کرامت الله فاضل


څيړونکي: عبد الباري همت

پيژندنه

څيره په نړيواله کچه يو له مهمو مساله يي او طبي نباتاتو څخه ده چې په پراخه کچه په غذايي توکو او درملو کې استعماليري او په اکثره هيوادونو لکه هند، ايران ترکيه، مصر او نورو کې د غذا د ښه خوند او بوی لپاره د مسالي په شکل استعماليري. څيره د عايداتو د لاسته راوړنې يو ښه نبات گڼل کيري. ددې نبات حاصلات په افغانستان کې د نړۍ په نسبت ډير لږ دي او مختلف عوامل کيدای شي ورباندې اغيزې ولري. د کرلو د مناسبي طريقي نشتون په لويه کچه د څيري حاصلات زيانمنوي او ورسره د ښې ودې او حاصل لپاره د سرو مدیریت او د عناصرو رسول ډير اړين او مهم دي، دا چې دا برخه په هيواد کې ډيره لږه څيړل شوې ده نو ځکه مي وغوښتل چې اغيزې يې په کندهار ولايت کې وڅيړم.


موندنې

د ودې په مختلفو مراحلو کې د څيرې قد (سانتي متر)




اول گراف: د نبات جگوالی

د ودې په مختلفو مراحلو کې د څيرې وچ وزن (گرام/متر مربع)



دوهم گراف: د نبات وچ وزن

پر نبات باندې د ځانگو شمېر



درېم گراف: د ځانگو شمير پر نبات باندې

مواد او کړنلاره

ياده څيړنه د کندهار ولايت د ډنډ ولسوالۍ د رحواني کې د ۲۰۲۴ ميلادي کال په جريان کې ترسره شوله، د تجربوي ساحې خاوره (Sandy loam) او د 7.75 پي ايچ درلودونکې وه. څيړنه په (Split Plot Design) او دريو تکرارنو کې ترسره شوه چې اصلي او فرعي تيريميټونه يې په لاندې ډول وو:

الف: اصلي پلاټونه (د کرلو طريقې)

ب: فرعي پلاټونه (د نايټروجن اندازې)

N_0 : کنترول (0 kg N / ha)

N_{20} : (20 kg N / ha)

N_{40} : (40 kg N / ha)

N_{60} : (60 kg N / ha)

S_1 : قطاري کرنه

S_2 : په پاشان ډول کرنه

S_3 : د جوبې په ډول کرنه

پايله او سپارښتې

د څيري نبات ښه وده، د جوبې په ډول د څيري نبات کرل او پر هغه باندې د 60/ha نايټروجن په استعمال سره د څيري نبات په وده او د ودې په پرامترونو لکه د نبات جگوالي او د نبات وچ وزن کې د پام وړ مثبت بدلون درلود.

همدې پايلې ته په کتو سره د جوبې په شان د څيري نبات د کرلو او د نايټروجن 60 کيلوگرام پر هکتار د استعمال سپارښتنه کيري.

مننليک: د خپلو مهربانه والدينو ډيره زياته مننه کوم چې زما سره يې هلې ځلې کړې دي او تل يې زده کړو ته هڅولی يم. د خپلو ټولو محترمو او د قدر وړ استادانو څخه مننه کوم او بالخصوص د خپل مهربانه او قدر وړ لاړښود استاد پوهنيار کرامت الله فاضل صاحب څخه ډيره زياته مننه کوم چې زما سره يې په هره برخه کې ډيره زياته مرسته کړې ده او دده د مرستې له برکته ما دا څيړنه په برياليتوب سره بشپړه کړه.

د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څيړنو آمریت



د وردگو ولايت په دادميرداد ولسوالۍ کې د منو پروسس او بازار موندنې میتودونه

لارښوود استاد: پوهنډوي سورگل اعظمي

څيړونکي: احمدالله (احمدي)

پېژندنه: مېنه د (Pome fruit) له ډلې څخه ده چې د (Pyrus) په جنس او (sylvistres) په سپيشز او د (Rosaceae) په کورنۍ پورې اړه لري، د ډيرو کرل کيدونکو ميوو له ډلې څخه ده چې ونه يې کوچنۍ يا لويه او پاڼيزې ده چې د ۵-۱۲ مترو پورې اوږدوالی لري او پراخه کڼي شاخونه لري. پاڼې ساده (Ovals) يا هگۍ ډوله دي چې په متناوب ډول سره ترتيب شوي دي، د (۵-۱۲) سانتي متره اوږدوالی لري او د (۳-۶) سانتي مترو پورې پراخوالی لري (Petiole) يې د ۲-۵ سانتي مترو پورې اوږدوالی لري او پاڼه يې تيره څوکه لري، او اړه ډوله څنډې لري. گلان يې سپين رنگ لري او گلابي ټکي (نښې) پکې هم موجودې وي چې په پسرلي کې د پاڼو دغوټيو دسپړلو سره سم غوړيږي چې بيا تدريجاً مړوي کيږي او رږيږي. داچې په نوموړي ولسوالۍ کې خلک د منو د پروسس او بازار موندنې د ميتودونو سره نا آشنا دي دا د څيړنې د اصلي ستونزې څخه بلل کيږي. او ددې څيړنې په ترسره کولو سره به تر يو حده پورې حل شي. د منو د پروسس او بازار موندنې ميتودونه روښانه کول، د بزگرانو لپاره د منو د پروسس گټورتوب معلومول د څيړنې د اصلي موخو څخه گڼل کيږي.

مواد او کړنلاره:

په نوموړي څيړنه کې له دوه ډوله معلوماتو څخه کار اخيستل شوی.

لومړني معلومات دسلو پوښتنپاڼو پواسطه د نوموړي ولسوالۍ د کروندگرو څخه د (SRS) يا هم ساده اتفاقي نمونه نيونې د ميتود راتول شوی دی، او بيا وروسته د (Excell) پروگرام له لاري تحليل او گراف بندي شوی او د موضوع اړوندو پوښتنو ته پکې ځوابونه ويل شوي دي. دوهمي معلومات د مختلفو داخلي او خارجي معتبرو کتابونو، انټرنېټي ويب سايټونو او مقالو څخه استفاده شوي ده.


پايله او سپارښتنې:

د دې څيړنې هدف د وردگو ولايت په دادميرداد ولسوالۍ کې د منو کچه په خاصه توگه ددې ولايت او په عام ډول د ټول هيواد په کچه يو عمده توليد او محصول بلل کيږي او سالانه ميليونه افغاني عايد ترې ترلاسه کيږي، د ښې ادارې او منجمنټ لپاره هغه هم په خاصه توگه وروسته له توليد څخه (Post-harvest management) تر مصرف کونکي (consumer) پورې د اهميت وړ بلل کيږي. باغ لرونکي بايد خپل محصولات پروسس کړي او د بازار موندنې د ميتودونو سره ځان آشنا کړي، دولت بايد مارکيتونو ته د منو د انتقالولو لپاره د ترانسپورت ستونزې حل کړي تر څو باغ لرونکي وکولای شي خپلې منې په وخت مارکيتونو ته ورسوي، سوداگر بايد د باغ لرونکو توليدات خارجي مارکيتونو ته انتقال کړي.


منتليک: په لومړۍ سر کې د خپلو والدينو (مور او پلار) او خپلې کورنۍ څخه مننه کوم چې راسره يې نه سترې کيدونکې هلې ځلې کړې، او هر وخت يې خپلو درسونو ته تشويق کړي يم. په دوهم قدم کې د کرنيز اقتصاد او توسعې پوهنځي له استادانو بالخصوص د خپل لارښود استاد څخه مننه کوم چې د خپلو مصروفيتونو سره سره يې ددې څيړنې په تر سره کولو کې ماته لازمي لارښوني کړې.

د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څيړنو آمریت


تاسو د بازار موندنې د کومو ميتودونو څخه استفاده کوئ؟



تاسو د بسته بندۍ د کومو ميتودونو څخه استفاده کوئ؟



ايا د بزگرانو لپاره د منو پروسس گټور دی؟





د هلمند په ولايت كي د كوكنارو بدیل معیشت

لارښود استاد: پوهنيار عبدالهادي واصل

څيړونكي: عبدالقوي عادل

پېژندنه

د كوكنارو كښت چې د ترياكو او هېروينو سرچينه ده، چې په انگليسي كې ورته (Opium poppy) وايي او علمي نوم يې (Papaver somniferous) دي، چې د نشه يي توكو د قاچاق، اعتياد او جنايي فعاليتونو سره د تړاو له امله د افغان حكومت او نړيوالي ټولنې لپاره يوه لويه ستونزه ده، هغه ستونزه چې يو هيواد يې د دولت جوړني، حكومت داري، امنيت، او پراختيا په برخه كې ورسره مخ وي. د ستونزې پراختيا او اهميت په نړيواله كچه بې سارې دي، د ۲۰۰۲ كال راهيسي د نوموړي نبات كركيله ډيره سوي او هم يې كارو بار ډير سوي دي چې د دولت او مربوطه ارگانو له لوري د بندولو پلانونه ناكام شويدي (Ward, Mansfield, & Oldham. 2008). د كوكنارو سره د مبارزې يوازي لاره د بدیل معیشت وده ده، د بدیل معیشت موخه خپله ديوېل چا په فعاليتونو كي مداخله كول دي چې د ټولنې يا هېواد لپاره زيانمنونكي وي (Wright, Rowcliffe, Kumpel, & Milner. 2016). افغانستان د ۱۹۹۰ لسيزې په اوږدوكې د نړۍ د ناقانونه هېروينو د اكمالاتو اصلي سرچينه وه، د ۲۰۰۰ كال په وروستيو كې طالبانو دگواښونو، جبري له منځه وړلو، او دعامه مجازاتو له لاري د كوكنارو په كښت بنديز ولگيدي. علاوه پردې، د طالبانو د حكومت تر سقوط وروسته د جمهوريت په دوره كې بيا د كوكناروكركيله زياته شوله چې د افغان حكومت او نړيوالي ټولنې د زياتو مصارفو سره سره پدې ونه توانيدل چې د كوكنارو كښت بند كړي (Farrell, & Thorne, 2005). دا چې ترياك يو غيري قانوني كښت دي او په هلمند ولايت كې په زياته اندازه كرل كيدله، د اوسني حكومت د فرمان پر اساس په ټوله هيواد كې د كوكنارو كښت بند شو، نو پدې اساس ددې ستونزې د حل په موخه دا څيړنه په هلمند ولايت گرځك ولسوالۍ كې ترسره كيږي چې بدیل معیشت ورته پيداسي تر څو د اقتصادي بسا يني لپاره د كوكنارو پر كښت باندي د سيمو تكيه راكمه سي. نو دا څيړنه د ځانگړو موخو لپاره تر سره كيږي، چې عبارت ده تر څو د كوكنارو دبدیل معیشت نباتاتو معلومول او د كړونده گرو د ستونزو معلومول دي.

موندنې

۱ جدول: د كوكنارو لپاره بدیل نباتات د بدیل معیشت په توگه.

پنبه د كوكنارو بدیل معیشت په توگه	فريكونسي	فيصدي
مخالف	7	13.7
زيات مخالف	1	2.0
نه موافق نه مخالف	10	19.6
موافق	11	21.6
زيات موافق	22	43.1
ريحان د كوكنارو د بدیل معیشت په توگه		
مخالف	4	7.8
زيات مخالف	12	23.5
نه موافق نه مخالف	16	31.4
موافق	11	21.6
زيات موافق	7	13.7

۲ جدول: د كړونده گرو ستونزې.

د كړونده گرو ستونزې د كوكنارو د بدیل معیشت په وړاندي	فريكونسي	فيصدي
د اصلاح سو تخمونو كموالي	44	86.3
د امراضو شتون	47	92.2
د ترويجي خدماتو نه شتون	29	56.9

مواد او كړنلاره

دا څيړنه د هلمند ولايت د گرځك ولسوالۍ كي ترسره سوي چې نوموړي ولسوالۍ شاوخوا (۲۰۷) كلي لري چې د دې كليو څخه پنځه كلي د څيړنې ساحه تشكيلوي لكه ميرمندان، سامينار، ده ادم خان، مالگير، او سپين مسجد، چې د گرځك ولسوالۍ ياد كلي كې په هدفې ډول ددې څيړنې لپاره انتخاب سويدي او د ۵۱ كړونده گرو نومونه د دې څيړنې لپاره وکارول سوه. چې بالاخره د ارقامو د راټولو لپاره سوال پاڼه ترتيب او په زريعه يی معلومات راټول سول.

پايله او سپارښتنې

د دې څيړنې د تر سره كولو وروسته موږ دې پايلې ته رسيدو چې زيات شمېر كړونده گرو پنبه د كوكنارو لپاره د يو ښه بدیل په زيات موافق دي نو بايد مربوطه ادارې د پنبې د اعظمي توليد لپاره روزني او ترويجي خدمات ډير كړئ. همدارنگه په زيات تعداد كړونده گرو د زياتو امراضو شتون، د اصلاح سو تخمونو كموالي او پدې ډول د ترويجي خدماتو نشتون په شان ستونزو څخه سر ټكوي. نو د يادو ستونزو لپاره تر ټولو لومړۍ د زراعت اړونده ادارې او همدارنگه نوري زيربط ادارې د يادو ستونزو د حل په موخه كوټلي گامونه واخلي تر څو يوې خوا كړونده گرو د غير قانوني كركيلې پرېږدي او د بلې خوا يی توليدات اعظمی حد ته ورسېږي.

منلېک

په لومړي سر كې د خپلو والدينو او وروڼو څخه ډيره مننه كوم او همدارنگه د خپل قدرمن لارښود استاد پوهنيار عبدالهادي (واصل) څخه چې د خپلو ډيرو مصرفيتونو سره سره يې زما سره د دې موضوع په تحقيق، تحليل او تجزيه كې پوره همكاري وكړه ډير ډير كور و دانۍ يې وايم او د مونوگراف استاد ښاغلي الحاج سيد محمد كبير آغا مين څخه هم مننه كوم.

د افغانستان د كرنيزو علومو او ټكنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څيړنو آمريت




د بادرنګو پر وده د رېښې غوټه کوونکو نيماتودونو (*Meloidogyne* spp.) اغيزې

څيړونکي: عبدالحق سلارزی، ثناء الله خادم او احسان الله فرمان

پېژندنه


بادرنګ (*Cucumis sativus* L.) د Cucurbitaceae کورنۍ نبات دی چې په خپل ترکیب کې له 93-95% اوبه او په مختلفو کچو اړین مواد (سودیم، مګنیزیم، پوتاشیم، سلفر، سلیکان، فلوراید، اوسپنه، او مختلف ویتامینونه) لري. په افغانستان کې د بادرنګو د تولید کچه په آزاده کرونده کې $30t/ha$ او په شنو خونو کې $171t/ha$ ده. رېښې غوټه کوونکي نيماتودونه په نړیواله کچه د سبزیجاتو د حاصلاتو محدودونکي عوامل بلل کېږي او د زیان کچه یې (50-80%) ثبت شوې ده. د کندهار ولایت د شنو خونو په بادرنګو کې د نوموړو نيماتودونو د زیان کچه شاوخوا (35%) ښودل شوې ده. د نوموړو پتوجنونو د برید له امله پر کوربه نباتاتو د څرګندو علایمو نشتون بزرګان د ناروغۍ د پېژندنې له ستونزو سره مخ کړي دي. په دې څېړنه کې د رېښې غوټه کوونکو نيماتودونو پر وړاندې د بادرنګو د Deltaseed F1 کلتیوار عکس العمل او د دې پر وده د نوموړو پتوجنونو اغېزې څېړل شوي دي.

پر یوه نبات د پاڼو شمېر




چارټ ۱: د بادرنګو پر بوټو د پاڼو شمېر

د بوټو د قد اندازه



چارټ ۲: د بادرنګو د بوټو د قد اندازه

پر پاڼو د کلوروفیل کچه



چارټ ۳: د بادرنګو د بوټو پر پاڼو د کلوروفیل اندازه



شکل ۱: په څېړنیزه ساحه کې د بادرنګ بوټي: الف: د څېړنې ډیزاین، ب: روغ بوټی، ج: د نيماتودونو د برید له امله د بادرنګو د بوټي مړينه

مواد او کړنلاره

موقعیت: کندهار ښار اوومه ناحیه مېرویس مېنه ($31^{\circ} 61' N$, $65^{\circ} 65' E$)

د څېړنې مواد:

تخم: Delta seed F1

د کرلو نېټه: ۱۴۰۲/۰۳/حوت

د ناروغۍ اناکولم: T1 (200), T2 (360), T3 (440), T4 (640), T0 (0) J2s /200 cc soil

ډیزاین: RBD څلور تکرارونه

د ثبت شوو ارقامو تحلیل او تجزیه: SPSS v.26.0

پایله

د څېړنې د پایلو د تحلیل پر بنسټ د بوټو د شنو برخو بې رنگي، د ودې کموالی، مړاوې کېدنه او د بوټو مړینه د ناروغۍ څرګند علایم بلل دي. د بوټو تحدید د عامل د اناکولم په زیاتوالي سره په مستقیم شکل زیاتوالی کوي چې د اناکولم په شدت سره د ټولو بوټو مړینه هم رامنځ ته کېدای شي.

منلېک

له خپل قدرمن استاد پوهنیار حکمت الله نیمګړي د بې سارې مرستې په پار نړۍ مننه

د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، د علمي څېړنو آمریت